


# Kuras.

SEGMENTO DE MERCADO



Variedad tardía para la producción de fécula, resistente a los nematodos del quiste de la patata y con un muy buen rendimiento de fécula.

- ▶ **Carne blanca**
- ▶ **Buena capacidad de almacenamiento**
- ▶ **Buena resistencia a los virus y al mildiu**



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtendor:** G. Kuper

**Cruzamiento:** PG 285 x AR 69-0491

**Plántula:** KU 80-1271

**Derechos de obtendor:** 31-12-2023

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** tardía / 4

**Color claro del brote:** azul violeta

**Color de la flor:** blanca

**Número de bayas:** ninguno / 4

**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7

**Follaje - desarrollo final:** bastante bueno / 7,5

**Follaje - selectividad:** media / 6

**Follaje - firmeza:** bastante firme / 7,5

**Color de la carne:** blanca / 4,5

**Color de la piel:** amarilla

**Finura de la piel:** bastante pobre / 5

**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7,5

**Forma de los tubérculos:** redondo oval

**Regularidad de la forma de los tubérculos:** bastante regular / 6

**Tuberización:** media / 6

**Regularidad del tamaño:** regular / 7

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** bastante corta / 5,5

**Metribuzina:** ligeramente sensible / 7

**Bentazona:** - / -

**Etileno:** - / -

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6

**Grietas de crecimiento:** ligeramente sensible / 7

**Manchas negras (magulladuras internas):** bastante sensible / 6

**Daños de recolección:** sensible / 5,5

**Peso bajo agua:** 490

**Contenido de materia seca:** 25,9%

**Distribución de la materia seca:** - / -

**Nivel de TGA:** 33,8

**Calidad para chips:** inadecuada / 4,5

**Calidad para patatas fritas:** por debajo de la media / 5,5

**Tipo de cocción:** harinosa / C

**Coloración en crudo:** - / -

**Coloración gris (después de la cocción):** muy sensible / 4,5



[www.agricopotatoes.com/es/kuras](http://www.agricopotatoes.com/es/kuras)

# CÓMO CULTIVAR

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar + 5%.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar + 10%.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** resistente\* / 9\*

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** ligeramente a no sensible / 8

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente a no sensible / 8

**Sarna común:** sensible / 5,5

**Sarna pulverulenta:** ligeramente sensible / 6,5

**Fusarium:** ligeramente sensible / 7

**Erwinia:** sensible / 5

**Antracnosis:** - / -

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 6,5

**Virus del enrollado:** ligeramente sensible / 7

**Virus - A:** ligeramente a no sensible / 9

**Virus - X:** ligeramente a no sensible / 8,5

**Virus - Yn:** ligeramente a no sensible / 8

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente a no sensible / 9

**Sarna verrugosa F1:** resistente / 10

**Sarna verrugosa F6:** bastante sensible / 5

**Sarna verrugosa F18:** - / -

\* Los resultados marcados con un asterisco (\*) están basados en nuestra propia investigación y aún no se han publicado oficialmente.