



Επόμενης Γενιάς

# Twister.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Μεσοπρώιμη, γενικής χρήσης, καλή απόδοση και ανθεκτική στον περονόσπορο. Κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια.

- ▶ Όμορφη εμφάνιση
- ▶ Καλή αποθήκευση
- ▶ Εξαιρετικό τηγάνι



ΚΑΜΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: G.W. te Winkel

Διασταύρωση: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Σπορόφυτο: TW 08-1507

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2048

## Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 7

Χρώμα φύτρου: κόκκινο βιολετί

Χρώμα άνθους: ανοικτό μωβ

Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 5,5

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7

Σχήμα κονδύλου: στρογγυλό οβάλ

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

## Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: αρκετά μακρύς / 7

Metribuzin (Sencor): πολύ ευαίσθητη / 3

Bentazon: αρκετά ευαίσθητη / 6

Αιθυλένιο: 5% λιγότεροι κόνδυλοι / 4

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Μηχανικοί χειρισμοί: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Βάρος εντός νερού: 345

Στερεά ουσία: 19%

Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά σφικτή / AB

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5



[agricopotatoes.gr/twister](http://agricopotatoes.gr/twister)

## ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

### Λίπανση<sup>1</sup>

**Άζωτο:** συνηθισμένη δοσολογία +20%.

**Φώσφορος:** συνηθισμένη δοσολογία.

**Κάλιο:** συνηθισμένη δοσολογία.

<sup>1</sup> Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

### Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Προαιρετικό σπάσιμο των φύτρων μια φορά.

### Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/50 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

### Ζιζάνια

Να μη χρησιμοποιείται metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά, καθώς επηρεάζει σημαντικά το φύλλωμα και προκαλεί σημαντική μείωση της παραγωγής.

### Μυκητοκτόνα

Παρά την ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, χρειάζεται επαγρύπνηση για προσβολές.

### Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

### Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 6 °C. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



### Ανθεκτικότητες

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Περονόσπορος φύλλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 9

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: ευαίσθητη / 5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Καρκίνωση 1: μέτρια ευαίσθητη / 8

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιερητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες προνοιες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

