


Loreley.

SEGMENTO DE MERCADO



Variedade semiprecoce para salada, com um bom número de tubérculos e um bom teor de matéria seca.

- » Polpa firme após cozedura
- » Excelente aspeto
- » Boa resistência ao vírus Y



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

Obtento: Agrico Research B.V.
Cruzamento: MA 98-0322 x AR 98-0341
Clone: AR 05-1440
Direito do obtento: 31-12-2046

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semioprecoce / 7
Brolho de cor clara: violeta vermelha
Cor da flor: branca
Número de bagas: nenhuma / 4
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Folhagem - seletividade: média / 6,5
Firmeza da folhagem: média / 6

Cor da polpa: amarela / 7,5
Cor da pele: amarela
Acabamento de pele: muito boa / 7,5
Calibre dos tubérculos: muito grande / 7
Forma dos tubérculos: longa oval
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: muito alta / 7
Regularidade do calibre: regular / 7

Sensibilidade e qualidade

Dormência: média / 6
Metribuzina: bastante sensível / 6
Bentazona: ligeiramente sensível / 7
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

Segundos crescimentos: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: bastante sensível / 6

Peso debaixo de água: 359
Teor de matéria seca: 19,7%
Distribuição da matéria seca: excelente / 8
Nível TGA: 8,45

Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 5
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4
Grupo culinário: firme / A
Descoloração em cru: sensível / 5
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7



www.agricopotatoes.com/pt/loreley

COMO CULTIVAR

Fertilização¹

Azoto: conselho padrão.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 10%.

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

30/40 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 plantas/ha)

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistências

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: - / -

Nemátode, *Globodera pallida* Pa 2: - / -

Nemátode, *Globodera pallida* Pa 3: - / -

Míldio da folha: muito suscetível / 4

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6

Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6

Sarna pulverulenta: suscetível / 5

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6,5

Erwinia: - / -

Antracnose: ligeiramente suscetível / 6

TRV: muito suscetível / 4,5

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus - A: - / -

Vírus - X: - / -

Vírus - Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -