

Adato.

MARKTSEGMENT



Een middenlaar consumptieras met mooie knollen en een vrij goed onderwatergewicht.

- » Goede schilkwiteit
- » Goede droogtetolerantie
- » Geschikt voor diverse gerechten



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: NICOLA x RED BARON
Zaailing: SW 04-0087
Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaar / 6
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Vleeskleur: crème / 5,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7,5
Bentazon: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschaadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 374
Drogestofgehalte: 20,4%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 4,56

Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Kooktype: kruimig / BC
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/adato

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaar temperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -