



Jolene.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Ειδικής Χρήσης
Για τυποποίηση

Μεσοόψιμη, με καλή αντοχή στη ζέστη και υψηλή απόδοση.

- ▶ Ανοικτό κίτρινο χρώμα σάρκας
- ▶ Γενικής χρήσης, πολύ καλή για τηγάνι
- ▶ Καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.

Διασταύρωση: SAGITTA x AR 03-1491

Σπορόφυτο: AR 09-2556

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2050

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 6

Χρώμα φύτρου: κόκκινο

Χρώμα άνθους: λευκό

Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 7

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: αρκετά υψηλή / 7

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: μέτριος / 6

Metribuzin (Sencor): αρκετά ευαίσθητη / 6

Bentazon: - / -

Αιθυλένιο: - / -

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6

Βάρος εντός νερού: 389

Στερεά ουσία: 21,1%


Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 5

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5



agricopotatoes.gr/jolene

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Περωνόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4

Περωνόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5

Ακτινομύκωση: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστη ευαίσθητη / 6,5

Φουζάριο: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Ίωση- Spraing: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστη έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστη έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιεργητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες προνοίες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

