

Constance.

MARKTSEGMENT



Traditioneel

Retail
Vers

Een midden vroeg consumptieras
met een prachtige gele huid
en lichtgele vleeskleur.

- » Prachtige uitstraling
- » Midden vroege rijptijd
- » Vrij vastkokend



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: J.L. Spijkman
Kruising: MARABEL x AR 93-1243
Zaailing: SA 02-0020
Kwekersrecht: 31-12-2044

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Groei scheuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging: zeer gevoelig / 4,5

Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,7%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 4,3

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/constance

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 15%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 15%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 36 cm (37.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoeding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: zeer vatbaar / 4,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 3

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -