

# Beyonce.

Chipssort för långlagring med bladmögel- och brunrötaresistens. Beyonce är en av våra Next Generation sorter.

- ▶ Stora knölar
- ▶ Lång groningsvila
- ▶ Ganska hög knölsättning



## MARKNADSSEGMENT

 Ekologisk odling

 Industri  
Chips, Flingor

## EGENSKAPER

### Allmänna egenskaper

**Förädlare:** Agrico Research B.V.  
**Korsning:** AR 94-2061 x LADY JO  
**Nummersort:** AR 08-3271  
**Förädlarrätt:** 31-12-2049

### Växtens och knölens egenskaper

**Mognad:** medelsen / 6  
**Ljus groddens färg:** blå-violett  
**Blomfärg:** lila  
**Antal bär:** ingen / 4  
**Blast - inledande utveckling:** ganska snabb / 7,5  
**Blast - slutlig utveckling:** tidig / 8  
**Blast - rensbarhet:** genomsnittlig / 6,5  
**Blast - styrka:** ganska tålig / 7,5

**Köttfärg:** ljusgul / 6,5  
**Skalfärg:** gul  
**Skalfinish:** under genomsnittlig / 5,5  
**Knölstorlek:** ganska stora / 7,5  
**Knölform:** oval rund  
**Knölens regelbundenhet:** ganska jämn / 6,5  
**Knölsättning:** ganska hög / 7  
**Regelbundenhet i storleken:** jämn / 7

### Känslighet och kvalitet

**Groningsvila:** ganska lång / 7  
**Metribuzin:** något känslig / 7,5  
**Bentazon:** något till inte känslig / 8  
**Etylen:** 5 % färre till 5 % fler knölar / 5

**Återväxt:** ganska känslig / 6  
**Växtsprickor:** ganska känslig / 6,5  
**Stöttblätt (inre blåmärken):** något känslig / 7,5  
**Mekaniska skador:** ganska känslig / 6

**Undervattenvikt:** 446  
**Torrsubstanshalt:** 23,9%  
**Fördelning av torrsubstans:** genomsnittlig / 6,5  
**TGA-nivå:** 6,5

**Chips kvalitet:** utmärkt / 8  
**Friterings kvalitet:** bra / 7  
**Koktyp:** mjölig / BC  
**Missfärgning efter råskalad:** något till inte känslig / 8  
**Grå missfärgning (efter kokning):** något känslig / 7

[www.agriconordic.com](http://www.agriconordic.com)

# HUR MAN ODLAR

## Gödsling<sup>1</sup>

**Kväve:** standardgiva.

**Fosfat:** standardgiva.

**Kalium:** standardgiva + 25 %.

<sup>1</sup> Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

## Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

## Planteringsavstånd

28/35 mm: 22-24 cm (58.000 plantor/ha)

35/55 mm: 26-28 cm (50.000 plantor/ha)

## Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

## Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

## Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

## Lagring

För industri ändamål får den helst inte förvaras under 9 °C. Lämplig för medellång lagring.

# Say potato, say Agrico.

## Motståndskraft

**Gul nematod Ro 1/4:** mottaglig / 4

**Gul nematod Ro 2/3:** - / -

**Vit nematod Pa 2:** - / -

**Vit nematod Pa 3:** - / -

**Bladmögel:** något till inte mottaglig / 8,5

**Brunröta:** något mottaglig / 7,5

**Vanlig skorv:** mottaglig / 5,5

**Pulverskorv:** något mottaglig / 6

**Fusarium:** något mottaglig / 7,5

**Bakterios:** - / -

**Svartpricksjuka:** något mottaglig / 7,5

**Rost:** något mottaglig / 6

**Virus - Bladrull:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** mottaglig / 5,5

**Virus - Yntn (knöl):** mottaglig / 5

**Potatiskräfta ras 1:** - / -

**Potatiskräfta ras 6:** - / -

**Potatiskräfta ras 18:** - / -