


# Chateau.

SEGMENTO DE MERCADO



Variedade precoce para salada, com um bom número de tubérculos e um teor de matéria seca muito bom.

- ▶ Excelente qualidade da pele
- ▶ Registo oficial tipo "Chair Ferme" (polpa firme)
- ▶ Tuberização elevada



## CARACTERÍSTICAS

### Características Gerais

**Obtento:** Agrico Research B.V.  
**Cruzamento:** MA 98-0322 x AR 98-0341  
**Clone:** AR 05-1443  
**Direito do obtento:** 31-12-2046

### Características da planta e dos tubérculos

**Maturação:** precoce / 7,5  
**Brolho de cor clara:** violeta azul  
**Cor da flor:** branca  
**Número de bagas:** inferior à média / 5,5  
**Folhagem - desenvolvimento inicial:** bastante rápido / 7,5  
**Folhagem - desenvolvimento final:** bom / 8  
**Folhagem - seletividade:** bastante fácil / 7  
**Firmeza da folhagem:** bastante firme / 7

**Cor da polpa:** amarela clara / 6,5  
**Cor da pele:** amarela  
**Acabamento de pele:** boa / 7  
**Calibre dos tubérculos:** muito grande / 7  
**Forma dos tubérculos:** longa oval  
**Regularidade da forma:** regular / 7  
**Tuberização:** alta / 8  
**Regularidade do calibre:** regular / 7

### Sensibilidade e qualidade

**Dormência:** média / 6  
**Metribuzina:** bastante sensível / 6  
**Bentazona:** ligeiramente sensível / 7,5  
**Etileno:** 5% a 15% mais tubérculos / 6  
**Segundos crescimentos:** bastante sensível / 6,5  
**Rachamentos:** bastante sensível / 6,5  
**Manchas negras:** ligeiramente sensível a não sensível / 8  
**Danos mecânicos:** sensível / 5  
**Peso debaixo de água:** 350  
**Teor de matéria seca:** 19,2%  
**Distribuição da matéria seca:** - / -  
**Nível TGA:** 4,2

**Qualidade para fritura em rodelas:** inadequada / 4  
**Qualidade para fritura em palitos:** inadequada / 4  
**Grupo culinário:** bastante firme / AB  
**Descoloração em cru:** ligeiramente sensível / 7,5  
**Descoloração após cozedura:** ligeiramente sensível / 7,5



# COMO CULTIVAR

[www.agricopotatoes.com/pt/chateau](http://www.agricopotatoes.com/pt/chateau)

## Fertilização<sup>1</sup>

**Azoto:** conselho padrão.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão + 20%.

<sup>1</sup> O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

## Distância de plantação

30/40 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 plantas/ha)

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

## Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistências

**Nemátode dourado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nemátode dourado Ro 2/3:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 2:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 3:** - / -

**Míldio da folha:** muito suscetível / 4

**Míldio do tubérculo:** suscetível / 5,5

**Sarna comum:** suscetível / 5,5

**Sarna pulverulenta:** muito suscetível / 2

**Fusarium:** ligeiramente suscetível / 7

**Erwinia:** - / -

**Antracnose:** muito suscetível / 4,5

**TRV:** suscetível / 5

**Vírus do enrolamento:** - / -

**Vírus - A:** - / -

**Vírus - X:** - / -

**Vírus - Yn:** ligeiramente suscetível / 7

**Vírus - Yntn (tubérculo):** ligeiramente suscetível / 6,5

**Verruga negra F1:** moderadamente suscetível / 8

**Verruga negra F6:** - / -

**Verruga negra F18:** - / -