

Evolution.

TRŽIŠNA NAMJENA




Tradicionalna

Maloprodaja
Svježa

Srednja rana sorta atraktivne tamnocrvene boje pokožice dobrog prinosa.

- ▶ Krupni gomolji
- ▶ Dobro podnosi sušu
- ▶ Otporan na više tipova krumpirove cistolike nematode



KARAKTERISTIKE

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.

Križanje: AR 94-0807 x AMOROSA

Sjeme: AR 99-0522

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 6,5

Boja klice: zeleno crvena

Boja cvijeta: svjetloljubičasta

Broj bobica: ispod prosjeka / 5

Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7,5

Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8

Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7

Lisna masa - čvrstoća: prosječno / 6,5

Boja mesa: svjetložuta / 6

Boja pokožice: crvena

Glatkoća pokožice: dobar / 7

Krupnoća gomolja: krupan / 8

Oblik gomolja: ovalno izduženi

Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6

Tuberizacija: umjereno velik / 7

Ujednačenost veličine gomolja: umjereno pravilan / 6,5

Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: kratka / 4

Metribuzin: malo osjetljiv / 7

Bentazon: malo osjetljiv / 7

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6

Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6

Nagnječenje (unutarnje): malo osjetljiv / 7

Oštećenje prilikom berbe: malo osjetljiv / 7

Podvodna težina: 343

Postotak suhe tvari: 18,9%

Raspodjela suhe tvari: - / -

TGA razina: 8

Kulinarški tip: umjereno brašnast / B

Oksidacija sirovog krumpira: - / -

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6



KAKO UZGOJITI

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke - 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke.

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Postupanje sa sjemenom

Moguća je sadnja izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka (zagrijavanja). Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja može izazvati reakciju na lišću, ali rijetko utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



Say potato,
say **Agrico.**

Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: umjereno osjetljiv / 6

Nematoda Pa 2: otpornost u polju / 7

Nematoda Pa 3: umjereno osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 6

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6,5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 6

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno osjetljiv / 7,5

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 6

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 7

Bradavičasta bolest krumpira F1: umjereno osjetljiv / 8

Bradavičasta bolest krumpira F6: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -