

Agata.

MARKTSEGMENT



Traditioneel

Retail
Vers

Een zeer vroeg, vrij vastkokend consumptieras met een mooie gladde schil en een hoge opbrengst.

- » Zeer vroege rijptijd
- » Goede virusresistenties
- » Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: BM 72-0052 x SIRCO
Zaailing: GE 77-0134
Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: zeer vroeg / 8
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: hoog / 8
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: kort / 4
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
Bentazon: - / -
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 316
Drogestofgehalte: 17,6%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 8

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/agata

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Fusarium: vatbaar / 5

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6,5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: vatbaar / 5

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -