

Armedi (AR 10-2432).

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Frites

Een middenlaat verwerkingsras
geschikt voor de fritesindustrie

- ▶ Goed knolaantal
- ▶ Geschikt voor lange bewaring
- ▶ Brede aardappelmoetheid resistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: TOPAS x BASIN RUSSET
Zaailing: AR 10-2432
Kwekersrecht: Aangevraagd

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: -
Bloemkleur: paars
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Vleeskleur: lichtgeel / 6

Schilkleur: geel

Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6

Knolgrootte: vrij grof / 7,5

Knolvorm: ovaal lang

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: gemiddeld / 6,5

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Metribuzin: zeer gevoelig / 4

Bentazon: - / -

Ethyleen: - / -

Talent: - / -

Doorwas: redelijk gevoelig / 6

Groei scheuren: weinig gevoelig / 7

Blauwgevoeligheid: gevoelig / 5,5

Rooibeschaadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 402

Drogstofgehalte: 21,8%

Drogstofverdeling: gemiddeld / 6,5

TGA-gehalte: 3,3

Chipskwaliteit: goed / 7

Frietkwaliteit: uitstekend / 8

Kooktype: kruimig / C

Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5

Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 25%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (55.000 planten/ha)

35/55 mm: 34 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3: partieel resistent / 7

Aardappelmoetheid Pa 2: resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 3: partieel resistent / 8

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: - / -

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Yntn: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent* / 10*

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '**' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.