2026
2027

Varieties:



VARIETIES
OF LIFE

Say potato,
say Agrico.

AGRICO

VARIETIES **OF LIFE**

El mundo en el que cultivamos y comercializamos patatas está en constante cambio. El cambio climático, las nuevas leyes y normativas, y la creciente necesidad de producir alimentos de forma más sostenible plantean nuevos retos a toda la cadena de producción de la patata. Al mismo tiempo, sigue creciendo la demanda mundial de alimentos saludables, asequibles y en cantidades suficientes.

En Agrico, la respuesta a estos cambios empieza por la selección de variedades adecuadas. Porque, para Agrico, una variedad nunca es solo una patata. Cada variedad contribuye a obtener cultivos robustos, ofrece soluciones adaptadas al mercado y, en última instancia, ayuda a garantizar la seguridad alimentaria de una población mundial en crecimiento. Todo esto es lo que representa "Varieties of Life".

No hay dos mercados, climas o zonas de cultivo iguales. Por eso, desarrollamos y suministramos un amplio catálogo de variedades de patata, cada una con características adaptadas a unas condiciones, destinos y necesidades específicos. Esta diversidad nos permite responder en cualquier circunstancia a las necesidades de agricultores, clientes y consumidores, estén donde estén.

Las variedades que destacan por ser naturalmente robustas son una parte importante de nuestro catálogo. Con "Stronger by Nature", apostamos por variedades innovadoras que, gracias a sus características naturales, están preparadas para ofrecer un buen rendimiento y ayudar a Agrico a afrontar los retos del presente y del futuro. Menos insumos, mejores resultados. Así, desarrollamos variedades que contribuyen a una agricultura fuerte y viable a largo plazo.

Las variedades Next Generation de Agrico son un claro ejemplo de ello. Su resistencia natural al mildiu contribuye a la reducción de productos fitosanitarios durante el cultivo, al tiempo que ofrece mayor seguridad tanto a los agricultores como a los compradores. Al mismo tiempo, seguimos mirando hacia el futuro, desarrollando nuevas generaciones de variedades mejor preparadas aún para adaptarse a condiciones cambiantes.

Las variedades "Varieties of Life" van más allá de la genética y de las características del producto. También representan el conocimiento compartido, la colaboración con nuestros socios, agricultores y colaboradores, y la red internacional en la que operamos. Se trata de variedades que permiten hacer cosas diferentes
en distintas partes del mundo, pero que persiguen un mismo objetivo: contribuir a un cultivo de patata preparado para el futuro y garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones venideras.

Así es como seguimos construyendo, día tras día, un catálogo de variedades adaptadas a distintos climas, mercados y generaciones. Variedades que ofrecen resultados hoy y que contribuyen a las soluciones del mañana. ■



Mark Zuidhof
Director generalr

Contenido.










2 Introducción
4 Varieties of Life
8 Nuevas variedades 2026
18 Variedades Spotlight
28 Nuestras variedades
56 Próximas plántulass
62 Variedades con licencia
64 Índice
70 Leyenda
74 Términos técnicoss
79 Otros idiomas

Exención de responsabilidad
Agrico ha puesto todo el cuidado razonable en la elaboración de estas descripciones de variedades.
Sin embargo, toda la información está sujeta a cambios y Agrico no aceptará responsabilidad alguna por errore u omisiones. En ningún caso será Agrico responsable de cualesquiera daños que se deriven de la información contenida en estas descripciones o que estén relacionados con ella.

VARIETIES OF LIFE



El mundo está lleno de diferencias. Nuestras variedades deben ser capaces de adaptarse a ellas. Cada variedad tiene una finalidad específica: debe responder a las necesidades de quienes trabajan con ella, del mercado al que se destina y de las condiciones en las que se cultiva. Desde los usos locales hasta el rendimiento, la calidad y la fiabilidad, cada variedad se desarrolla para satisfacer una necesidad concreta.

Porque en Agrico no nos limitamos a desarrollar variedades de patata. Desarrollamos variedades que demuestran su valor allí donde realmente importa: con las personas que trabajan con ellas, en los mercados para los que se destinan y en las condiciones en las que se cultivan.

Esto es lo que representa “Varieties of Life”.

Desde hace más de 50 años, miramos más allá de la propia patata. A través de la mejora genética y de la investigación, trabajamos para desarrollar variedades que respondan a las necesidades de un mundo en constante evolución. Este trabajo ha dado lugar a una amplia gama de variedades desarrolladas para adaptarse a las distintas condiciones de cultivo, usos y necesidades de los mercados de todo el mundo.

Y no nos centramos únicamente en las necesidades actuales. Nuestras variedades también deben estar preparadas para afrontar los retos del mañana. Por eso seguimos invirtiendo en genética de calidad, conocimientos y mejora varietal. “Stronger by Nature” demuestra cómo convertimos esta ambición en realidad: con variedades naturalmente robustas, que aprovechan los insumos de forma eficiente y ofrecen un rendimiento fiable en una amplia variedad de condiciones.

Pero el valor de una variedad no se consigue únicamente mediante la mejora genética. También debe demostrarse en la práctica. Por eso colaboramos con profesionales de todo el mundo, compartiendo conocimientos y aunando la experiencia local con la especialización internacional. Así trabajamos juntos para construir cadenas de valor de la patata sólidas.

Esto significa que “Varieties of Life” adquiere un significado diferente en cada parte del mundo, pero siempre basándose en una misma idea: desarrollar variedades que aporten valor a las personas, los mercados y el mundo del mañana.

No nos limitamos a desarrollar variedades de patata. Desarrollamos variedades pensando en las personas, las culturas, los mercados y las condiciones climáticas.

Nuestras variedades van más allá de la propia patata. Junto con nuestros conocimientos, experiencia y colaboración a escala internacional, nuestras variedades contribuyen a la seguridad alimentaria, a una agricultura viable a largo plazo y al desarrollo de cadenas de valor de la patata sólidas. Así es como "Varieties of Life" se configura en la práctica.

Agricultura preparada para el futuro

Variedades que responden a unas condiciones cambiantes y contribuyen a un cultivo de patata robusto, productivo y sostenible.

Seguridad alimentaria

Variedades que contribuyen a una producción estable y ayudan a garantizar el suministro de alimentos saludables, sanos y asequibles en cantidades suficientes.

Colaboración global

Al combinar nuestra experiencia internacional con los conocimientos y la experiencia locales, desarrollamos variedades adaptadas a distintos mercados, condiciones de cultivo y usos.

Conocimiento y desarrollo de la cadena de valor

Compartir conocimientos y colaborar a lo largo de toda la cadena de valor permite demostrar el valor de nuestras variedades en la práctica y contribuye al desarrollo de cadenas de valor de la patata sólidas.

PORQUE EN AGRICO UNA VARIEDAD NUNCA ES SOLO UNA PATATA.



¡NOVEDAD!

Nuevas variedades

Nos complace presentar cuatro nuevas y prometedoras incorporaciones a nuestro catálogo: Feliz (SW 14-7008), Jamaica (AR 14-0334), Texas (AR 14-3488) y Oregon (AR 14-3578).

Tras un exhaustivo periodo de ensayos de campo y pruebas de evaluación, las cuatro variedades han obtenido la aprobación oficial para su comercialización. Con su incorporación a la Lista Nacional de Variedades de 2026, las variedades Feliz, Jamaica, Oregon y Texas están listas para llegar al mercado con sus respectivos nombres comerciales.

NOVEDAD

Feliz
(SW 14-7008).

Al por menor
Ensaladas

Variedad semitemprana para ensalada, de tubérculos oval alargados, de carne firme a la cocción (tipo A) y alta resistencia al PVY.

- **Bonita piel**
- **Tipo de cocción A**
- **Buena resistencia al PVY**

NUEVO!



Características generales
Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: LORELEY x SW 06-0296
Plántula: SW 14-7008
Derechos de obtentor: Pendiente



Adrie Omtzigt
Jefe de producto

"Presentamos la variedad Feliz (SW 14-7008), la patata perfecta para preparar deliciosas ensaladas frescas. Feliz combina una apariencia atractiva con un rendimiento fiable. Sus tubérculos de forma largo-oval, la finura de su piel, un sabor intenso y una cocción firme hacen de la variedad Feliz una opción excelente para los segmentos de producto fresco y ensaladas del canal minorista. Gracias a un elevado número de tubérculos y a su alta resistencia al PVY (virus Y de la patata), la variedad Feliz ofrece a los agricultores una combinación atractiva de productividad y fiabilidad. Una variedad equilibrada que reúne una presentación atractiva, una excelente calidad culinaria y unas sólidas características agronómicas."

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo
Madurez: semitemprana / 7
Color claro del brote: -
Color de la flor: blanca
Número de bayas: - / -
Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Forma de los tubérculos: oval largo
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5
Tuberización: alta / 8
Tamaño de los tubérculos: medio / 6,5
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: bastante corta / 5,5

Sensibilidad y calidad
Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible a no sensible / 8
Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7
Daños de recolección: ligeramente sensible a no sensible / 8

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeramente sensible / 7,5
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6

Peso bajo agua: 358
Contenido de materia seca: 19,6%
Tipo de cocción: firme / A
Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7
Coloración en crudo: muy sensible / 4
Calidad para patatas fritas: - / -
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: -

Resistencias
Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente sensible / 7
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 8

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4
Mildiu de la hoja: muy sensible / 3,5
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: - / -
Sarna común: sensible / 5

Sarna pulverulenta: - / -
Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*
Sarna verrugosa F6: - / -
Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: sensible* / 4*
Nematodo dorado Ro 5: sensible* / 3*
Nematodo blanco Pa 2: moderadamente sensible* / 5*
Nematodo blanco Pa 3: sensible* / 3*

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados

Say potato, say Agrico.



CÓMO CULTIVAR

Fertilization[1]
Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente en tres aplicaciones, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla
Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada. Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación
30/50 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

Malas hierbas
El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas
Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección
Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento
La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.
[2] En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.

agricopotatoes.es/feliz

NOVEDAD

Jamaica (AR 14-0334).

Tradicional — Al por menor
Frescas

Variedad temprana -tradicional y al por menor- con bonita piel y buen tamaño.

- **Buena producción**
- **Bonita piel**
- **Buen tamaño**



Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: OS 07-0020 x SAVIOLA
Plántula: AR 14-0334
Derechos de obtentor: Pendiente



Adrie Omtzigt
Jefe de producto

"Presentamos la variedad Jamaica (AR 14-0334), una variedad temprana con gran potencial para el mercado de producto fresco. Gracias a su buen rendimiento, sus tubérculos de forma largo-oval y la finura de su piel, la variedad Jamaica (AR 14-0334) es una excelente opción para los segmentos de producto fresco y patata tradicional del canal minorista. La regularidad de la forma y el tamaño de sus tubérculos contribuyen a ofrecer una presentación uniforme y atractiva, mientras que su alta resistencia al PVY supone una ventaja adicional para los agricultores. La variedad Jamaica (AR 14-0334) combina un buen rendimiento, tubérculos atractivos y un comportamiento fiable. Una variedad prometedora con un gran potencial en el mercado de producto fresco."

CÓMO CULTIVAR

Fertilization[1]
Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla
Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada.

Distancia de plantación
28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (44.500 plantas/ha)

Malas hierbas
No usar metribuzina (Sencor) en post-emergencia, ya que causa una reacción grave en el follaje y una reducción importante del rendimiento.

Fungicidas
Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección
Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento
La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para la entrega directa desde el campo o el almacenamiento a corto plazo.

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.
[2] En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.

agricopotatoes.es/jamaica

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: temprana / 7,5
Color claro del brote: -
Color de la flor: blanca
Número de bayas: por encima de la media / 5
Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8
Follaje - desarrollo final: bastante bueno / 7,5
Follaje - firmeza: media / 6,5

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Forma de los tubérculos: oval largo
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: grande / 8
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible a no sensible / 8
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: bastante sensible / 6

Metribuzin[2] pre-emergencia: muy sensible / 3
Metribuzin[2] post-emergencia: muy sensible / 3
Etileno: - / -

Peso bajo agua: 332
Contenido de materia seca: 18,3%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6
Coloración en crudo: - / -
Calidad para patatas fritas: - / -
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: -

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 6

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente sensible / 6,5
Mildiu de la hoja: muy sensible / 3,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6

Fusarium: - / -
Sarna común: sensible / 5,5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: - / -
Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: sensible* / 1*
Nematodo dorado Ro 2/3: - / -
Nematodo dorado Ro 5: - / -
Nematodo blanco Pa 2: - / -
Nematodo blanco Pa 3: - / -

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados

Say potato, say Agrico.



NOVEDAD

Oregon (AR 14-3578).

Transformación
Patatas fritas de bolsa (chips)

Variedad tardía para chips, regular en la forma y tamaño de los tubérculos y buen contenido de materia seca.

- **Forma y tamaño regulares**
- **Buena calidad para chips, incluso tras un almacenamiento prolongado**
- **Pocos defectos en los tubérculos**

NUEVO!



Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LEANDRA x VR 808
Plántula: AR 14-3578
Derechos de obtentor: Pendiente



Adrie Omtzigt
Jefe de producto

"La variedad Oregon (AR 14-3578), una variedad fiable para elaborar patatas fritas de bolsa de alta calidad. La forma y el tamaño uniformes de sus tubérculos, su buen contenido de materia seca y su buena tolerancia a la antracnosis hacen de la variedad Oregon (AR 14-3578) una opción excelente para el segmento de las patatas fritas de bolsa. Esta variedad mantiene una buena calidad de fritura incluso tras un almacenamiento prolongado, lo que ofrece a los transformadores una valiosa flexibilidad a lo largo de toda la campaña. Gracias a la calidad constante de sus tubérculos y a sus excelentes características para el procesado, Oregon (AR 14-3578) combina uniformidad, buena capacidad de conservación y un rendimiento fiable en la elaboración de patatas fritas de bolsa. Oregon (AR 14-3578), calidad que perdura."

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: tardía / 5
Color claro del brote: -
Color de la flor: morada clara
Número de bayas: - / -
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Forma de los tubérculos: oval redondo
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: media / 6,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: sensible / 5

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeramente sensible / 7
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: - / -

CÓMO CULTIVAR

Fertilization[1]
Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente en tres aplicaciones, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar + 10%.

Tratamiento de semilla
Es preferible sembrar los tubérculos en un suelo caliente, ya que el desarrollo inicial de esta variedad es lento.

Distancia de plantación
30/40 mm: 26 cm (51.000 plantas/ha)
40/50 mm: 31 cm (43.000 plantas/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 plantas/ha)

Malas hierbas
El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas
Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección
Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento
La temperatura de almacenamiento adecuada es de 9 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio y largo plazo.

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.
[2] En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.

agricopotatoes.es/oregon

Peso bajo agua: 465
Contenido de materia seca: 24,9%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Coloración gris (después de la cocción): sensible / 5
Coloración en crudo: bastante sensible / 6,5
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Distribución de la materia seca: bastante deficiente / 5,5
Calidad para chips: excelente / 8
Nivel de TGA: -

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8
Virus - Yntn (tubérculo): - / -

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5
Mildiu de la hoja: muy sensible / 4,5
Mildiu del tubérculo: sensible / 5

Fusarium: - / -
Sarna común: ligeramente sensible / 6,5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: muy sensible* / 1*
Sarna verrugosa F6: muy sensible* / 1*
Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: - / -
Nematodo dorado Ro 5: - / -
Nematodo blanco Pa 2: - / -
Nematodo blanco Pa 3: - / -

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados

Say potato, say Agrico.



NOVEDAD

Texas (AR 14-3488).

Transformación
Patatas fritas

Variedad tardía de alto rendimiento, para la industria de french fries.

- **Alta producción**
- **Alto contenido de materia seca**
- **Múltiples resistencia a la sarna verrugosa**

NUEVO!



Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LEANDRA x AR 07-4113
Plántula: AR 14-3488
Derechos de obtentor: Pendiente



Roeland Jensma
Jefe de producto

"La variedad Texas (AR 14-3488) es una variedad de alto rendimiento desarrollada para la industria de patatas fritas. Gracias a su elevado contenido de materia seca, su buena calidad para la elaboración de patatas fritas y sus tubérculos de gran tamaño y forma regular, la variedad Texas (AR 14-3488) presenta excelentes características para el procesado industrial. Además, su resistencia a varios patotipos de la sarna verrugosa hace de la variedad Texas (AR 14-3488) una combinación perfecta entre rendimiento, adaptabilidad y calidad para la transformación industrial. Una variedad robusta y versátil para la producción de patatas fritas."

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5
Color claro del brote: -
Color de la flor: blanca
Número de bayas: medio / 6
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7,5
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Forma de los tubérculos: oval largo
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7
Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7
Daños de recolección: sensible / 5

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeramente sensible / 7
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: - / -

CÓMO CULTIVAR

Fertilization[1]
Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla
Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve acondicionamiento térmico de la semilla.

Distancia de plantación
28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantas/ha)

Malas hierbas
El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas
Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección
Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento
Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 °C. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.
[2] En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.

agricopotatoes.es/texas

Peso bajo agua: 427
Contenido de materia seca: 23%
Tipo de cocción: harinosa / C
Coloración gris (después de la cocción): sensible / 5,5
Coloración en crudo: muy sensible / 4,5
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Distribución de la materia seca: media / 6,5
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: -

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente sensible / 6,5
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 6

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5
Mildiu de la hoja: muy sensible / 4
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: - / -
Sarna común: sensible / 5,5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: resistente* / 10*
Sarna verrugosa F18: resistente / 10

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: - / -
Nematodo dorado Ro 5: - / -
Nematodo blanco Pa 2: - / -
Nematodo blanco Pa 3: - / -

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados

Say potato, say Agrico.



Variedades que destacan en varios mercados

Cada año destacamos en esta sección una selección de variedades sobresalientes, reconocidas por sus buenos resultados en el mercado, su calidad contrastada y su capacidad para satisfacer las necesidades de agricultores y clientes.

Gracias a la variedad y diversidad de nuestro catálogo, ofrecemos múltiples opciones para responder a distintas necesidades. Este año destacamos cuatro variedades que destacan especialmente: dos del segmento de transformación industrial, una del segmento tradicional y otra del canal minorista. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes, un rendimiento contrastado y una posición consolidada en el mercado.



Feliz
(SW 14-7008).

Variedad semitemprana para ensalada, de tubérculos oval alargados, de carne firme a la cocción (tipo A) y alta resistencia al PVY.

- **Bonita piel**
- **Tipo de cocción A**
- **Buena resistencia al PVY**

Al por menor
Ensaladas



Características generales
Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: LORELEY x SW 06-0296
Plántula: SW 14-7008
Derechos de obtentor: Pendiente

CÓMO CULTIVAR

Fertilization[1]
Nitrógeno: recomendación estándar. Preferiblemente en tres aplicaciones, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla
Se recomienda un breve calentamiento de la semilla o una pregerminación adecuada. Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación
30/50 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

Malas hierbas
El uso estándar de metribuzina (Sencor)[2] en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

Fungicidas
Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección
Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento
La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.
[2] En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.

agricopotatoes.es/feliz

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo
Madurez: semitemprana / 7
Color claro del brote: -
Color de la flor: blanca
Número de bayas: - / -
Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Forma de los tubérculos: oval largo
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5
Tuberización: alta / 8
Tamaño de los tubérculos: medio / 6,5
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: bastante corta / 5,5

Sensibilidad y calidad
Crecimiento secundario: bastante sensible / 6
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible a no sensible / 8
Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7
Daños de recolección: ligeramente sensible a no sensible / 8

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeramente sensible / 7,5
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeramente sensible / 7,5
Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6

Peso bajo agua: 358
Contenido de materia seca: 19,6%%
Tipo de cocción: firme / A
Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7
Coloración en crudo: muy sensible / 4
Calidad para patatas fritas: - / -
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: -

Resistencias
Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente sensible / 7
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 8

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4
Mildiu de la hoja: muy sensible / 3,5
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

Fusarium: - / -
Sarna común: sensible / 5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnosis: - / -

Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*
Sarna verrugosa F6: - / -
Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: sensible* / 4*
Nematodo dorado Ro 5: sensible* / 3*
Nematodo blanco Pa 2: moderadamente sensible* / 5*
Nematodo blanco Pa 3: sensible* / 3*

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados





Adrie Omtzigt
Jefe de producto

“Presentamos la variedad Feliz (SW 14-7008), la patata perfecta para preparar deliciosas ensaladas frescas. Feliz combina una apariencia atractiva con un rendimiento fiable. Sus tubérculos de forma largo-oval, la finura de su piel, un sabor intenso y una cocción firme hacen de la variedad Feliz una opción excelente para los segmentos de producto fresco y ensaladas del canal minorista. Gracias a un elevado número de tubérculos y a su alta resistencia al PVY (virus Y de la patata), la variedad Feliz ofrece a los agricultores una combinación atractiva de productividad y fiabilidad. Una variedad equilibrada que reúne una presentación atractiva, una excelente calidad culinaria y unas sólidas características agronómicass.”

Paradiso.

Tradicional

Variedad semitardía con grandes tubérculos y con un excelente rendimiento para el mercado tradicional.

- **Tubérculos grandes**
- **Bonita apariencia**
- **Buena tolerancia al calor y a la sequía**



Características generales

Obtentor:M. Pot & M. Klaver
Cruzamiento: RODEO x VALOR
Plántula: PK 06-0108
Derechos de obtentor: 31-12-2048

CÓMO CULTIVAR

Fertilization[1]
Nitrógeno: recomendación estándar - 10%. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla
Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación
28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
35/55 mm: 35 cm (38.000 plantas/ha)

Malas hierbas
El uso estándar de metribuzina (Sencor)[2] en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas
Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección
Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento
La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.
[2] En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.

agricopotatoes.es/paradiso

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 6
Color claro del brote: rojo
Color de la flor: morada
Número de bayas: por debajo de la media / 6,5
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7,5
Follaje - desarrollo final: bastante bueno / 7,5
Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Forma de los tubérculos: oval largo
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: grande / 8
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: ligeramente sensible / 7
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7,5
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: bastante sensible / 6,5

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeramente sensible a no sensible / 8
Metribuzin[2] post-emergencia: bastante sensible / 6,5
Etileno: 5% a 15% más tubérculos / 6

Peso bajo agua: 329
Contenido de materia seca: 18,2%%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6,5
Coloración en crudo: - / -
Calidad para patatas fritas: inadecuada / 4,5
Distribución de la materia seca: - / -
Calidad para chips: inadecuada / 4
Nivel de TGA: 4,8 mg/100g

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente sensible / 6
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7,5

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5

Fusarium: sensible / 5
Sarna común: sensible / 5,5
Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 7,5
Antracnosis: sensible / 5,5

Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: - / -
Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: - / -
Nematodo dorado Ro 5: - / -
Nematodo blanco Pa 2: - / -
Nematodo blanco Pa 3: - / -

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados



Douwe Werkman
Jefe de producto

"¡Paradiso lo tiene todo! Esta variedad da unas cosechas impresionantes con gran cantidad de tubérculos, y también destaca por su consistencia. Su planta robusta hace que Paradiso sea una elección de confianza, incluso en zonas más calurosas. Paradiso es sinónimo de éxito año tras año, rendimientos constantes y patatas preciosas. Únase al resto de clientes satisfechos y descubra la constancia y la calidad que ofrece esta variedad. ¡Cosechas infalibles con Paradiso!"

Say potato, say Agrico.



Sidney.

Transformación
Patatas fritas

Semi tardía, carne crema, variedad apta para la industria de french fries.

- **Tubérculos grandes**
- **Buena resistencia a las virosis**
- **Buena distribución de materia seca y adecuada para QSR.**



Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LADY ANNA x AR 05-3392
Plántula: AR 12-1680
Derechos de obtentor: 31-12-2054

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 6
Color claro del brote: -
Color de la flor: blanca
Número de bayas: - / -
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bastante bueno / 7,5
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: crema / 5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Forma de los tubérculos: largo oval
Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5
Dormancia: media / 6,5

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5
Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible / 7,5
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5
Daños de recolección: ligeramente sensible / 7

Metribuzin[2] pre-emergencia: bastante sensible / 6,5
Metribuzin[2] post-emergencia: bastante sensible / 6,5
Etileno: 5% menos a 5% más tubérculos / 5

Peso bajo agua: 396
Contenido de materia seca: 21,5%%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7
Coloración en crudo: ligeramente sensible / 7,5
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Distribución de la materia seca: excelente / 8,5
Calidad para chips: - / -
Nivel de TGA: 4,3 mg/100g

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7,5

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): ligeramente a no sensible / 8
Mildiu de la hoja: muy sensible / 4
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 8

Fusarium: ligeramente sensible / 6
Sarna común: sensible / 5,5
Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 6
Antracnosis: sensible / 5,5

Sarna verrugosa F1: muy sensible* / 1*
Sarna verrugosa F6: - / -
Sarna verrugosa F18: - / -

CÓMO CULTIVAR

Fertilization[1]
Nitrógeno: recomendación estándar. Es aconsejable una aplicación inicial alta, una segunda dosis es opcional.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar.

Tratamiento de semilla
Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación
28/35 mm: 26 cm (51.000 plantas/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/55 mm: 37 cm (36.000 plantas/ha)
Cut 50/60 mm: 34 cm (39.000 plantas/ha)[3]

Malas hierbas
No usar metribuzina (Sencor)[2] en post-emergencia, ya que causa una reacción grave en el follaje y una reducción importante del rendimiento.

Fungicidas
Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección
Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento
La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.
[2] En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.
[3] Cuando se permita el corte de tubérculos para la producción de patata de consumo, el cicatrizado adecuado y las estrictas medidas de higiene son esenciales para minimizar los riesgos de enfermedades. Cualquier corte y posterior uso de patatas de siembra, se realizará bajo el propio riesgo y responsabilidad del usuario.

agricopotatoes.es/sidney

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: sensible / 4
Nematodo dorado Ro 5: sensible* / 4*
Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo / 8
Nematodo blanco Pa 3: moderadamente sensible / 6

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados





Roeland Jensma
Jefe de producto

"La variedad Sidney ha sido desarrollada para freír. Sus tubérculos grandes y de forma larga-oval, la excelente distribución de la materia seca, el color crema de su pulpa y una calidad para la elaboración de patatas fritas superior a la media hacen de Sidney una opción perfecta para el segmento QSR (Quick Service Restaurants, restaurantes de servicio rápido). Esta variedad semitardía combina unas características muy interesantes para la transformación industrial con una buena resistencia a virus y a los nematodos del quiste de la patata (PCN). De este modo, ofrece a los agricultores un cultivo fiable y a los transformadores la calidad que buscan. No lo dude, apueste por la máxima calidad con Sidney."

Napoleon.

Transformación
Patatas fritas de bolsa (chips)

Variedad tardía para patatas fritas de bolsa (chips) con un tamaño uniforme y un alto contenido de materia seca.

- **Buena calidad para patatas fritas de bolsa (chips)**
- **Adecuada para la elaboración de copos**
- **Buena resistencia a virus**



Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: ANTINA x ALICANTE
Plántula: AR 10-4637
Derechos de obtentor: 31-12-2051

CÓMO CULTIVAR

Fertilization[1]
Nitrógeno: recomendación estándar - 10%.
Fósforo: recomendación estándar.
Potasio: recomendación estándar + 20%.

Tratamiento de semilla
Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación
30/40 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
40/50 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/60 mm: 38 cm (35.000 plantas/ha)

Malas hierbas
El uso estándar de metribuzina (Sencor)[2] en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas
Se recomienda un programa de tratamientos preventivos contra el mildiu.

Recolección
Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento
Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 9 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio y largo plazo.

[1] El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo.
[2] En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.

agricopotatoes.es/napoleon

CARACTERÍSTICAS

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: tardía / 5
Color claro del brote: rojo violeta
Color de la flor: blanca
Número de bayas: muy alto / 4
Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7
Follaje - desarrollo final: bueno / 8
Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la piel: amarilla
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Forma de los tubérculos: redondo oval
Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7
Tuberización: media / 6
Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7,5
Regularidad del tamaño: regular / 7
Dormancia: media / 6

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5
Manchas negras (magulladuras internas): sensible / 5,5
Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6
Daños de recolección: muy sensible / 4,5

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeramente sensible / 7
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeramente sensible / 7
Etileno: 5% menos a 5% más tubérculos / 5

Peso bajo agua: 450
Contenido de materia seca: 24,1%%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Coloración gris (después de la cocción): bastante sensible / 6
Coloración en crudo: bastante sensible / 6
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Distribución de la materia seca: buena / 7
Calidad para chips: excelente / 8
Nivel de TGA: 4,0 mg/100g

Resistencias

Virus del enrrollado: - / -
Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8
Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 8

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5
Mildiu de la hoja: ligeramente sensible / 6
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5

Fusarium: ligeramente sensible / 6,5
Sarna común: ligeramente sensible / 6
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnosis: ligeramente sensible / 6

Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: - / -
Sarna verrugosa F18: - / -

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: - / -
Nematodo dorado Ro 5: - / -
Nematodo blanco Pa 2: sensible / 4
Nematodo blanco Pa 3: sensible / 2

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados

Say potato, say Agrico.





Adrie Omtzigt
Jefe de producto

“Descubra Napoleon, ¡la variedad de patata por excelencia para unas patatas fritas de bolsa de alta calidad! Con su excelente calidad para freír, una distribución uniforme de la materia seca y un mínimo de puntas de azúcar, Napoleon proporciona un producto final magnífico y constante. Esta variedad produce buenos rendimientos y un tamaño muy uniforme, lo que es ideal para el segmento de las patatas fritas de bolsa. Su excepcional resistencia a virus y su adaptación a diferentes condiciones de cultivo hacen de Napoleon una variedad muy robusta. Cuando elige Napoleon, elige calidad y fiabilidad.”

Nuestras variedades 2026/2027

Un completo resumen de nuestro catálogo

Este catálogo reúne las principales variedades de nuestra amplia y diversa gama, presentadas en orden alfabético para facilitar su consulta. Cada variedad se identifica mediante un icono de color que permite reconocer de un vistazo el segmento de mercado al que mejor se adapta: tradicional, minorista o transformación industrial.

Además de nuestras variedades con licencia, el catálogo incluye una selección de variedades sin licencia que siguen gozando de gran reconocimiento y aceptación entre nuestros clientes..

Ecológico

Tradicional

Agrico Originals

Al por menor
Frescos, patatas baby, ensalada, especialidades

Transformación
Fécula, patatas fritas de bolsa, copos, patatas fritas, precocinados

Next Generation
Resistencia natural al mildiu



Agata.

Tradicional | Al por menor Frescas

Variedad muy temprana de consumo, con un tipo de cocción bastante firme, una atractiva piel lisa y un alto rendimiento.

- **Buena capacidad de almacenamiento**
- **Buena resistencia a virus**
- **Buena tolerancia a magulladuras y daños**



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: BM 72-0052 x SIRCO
Madurez: muy temprana / 8
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: excelente / 8
Tuberización: alta / 8
Dormancia: corta / 4

Peso bajo agua: 316
Contenido de materia seca: 17,6%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/agata

Agria.

Ecológico | Tradicional | Al por menor Frescas | Transformación Patatas fritas, patatas fritas de bolsa (chips), precocinadas

Variedad tardía de transformación, de carne amarilla, con un buen rendimiento y una calidad muy estable.

- **Excelente calidad para freír**
- **Resistencia a múltiples virus**
- **Buena capacidad de almacenamiento**



Caractéristiques principales

Obtentor: Böhm
Cruzamiento: QUARTA x SEMLO
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 402
Contenido de materia seca: 21,8%

Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Calidad para chips: muy buena / 7,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9
Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 6

agricopotatoes.es/agria

Alouette.

Ecológico | Tradicional | Al por menor Frescas | Transformación Precocinadas

Variedad semitardía de consumo, versátil, de piel roja, resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo, adecuada para la producción convencional y ecológica.

- **Buena tolerancia a magulladuras**
- **Adecuada para cocer y para frito casero**
- **Resistente al mildiu**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 02-139-1 x LAURA
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla / 7,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 389

Contenido de materia seca: 21,1%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 8
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/alouette

Arizona.

Tradicional

Variedad semitemprana de consumo que produce altos rendimientos en diversas condiciones climáticas.

- **Tubérculos de forma y tamaño uniformes**
- **Buena tolerancia a la sequía**
- **Resistencia a múltiples virus**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: media / 6

Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 301
Contenido de materia seca: 17%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 6

agricopotatoes.es/arizona

Armedi.

Transformación
Patatas fritas

Variedad semitardía de transformación, adecuada para la industria de las patatas fritas.

- **Buena tuberización**
- **Adecuada para el almacenamiento a largo plazo**
- **Resistencia múltiple a los nematodos del quiste de la patata**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: TOPAS x BASIN RUSSET
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 402
Contenido de materia seca: 21,8%

Tipo de cocción: harinosa / C
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 7
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5
Nematodo blanco Pa 2: resistente / 9
Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo / 8
Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9

agricopotatoes.es/armedi

Arsenal.

Transformación
Patatas fritas de bolsa (chips), copos

Variedad semitardía, para patatas fritas de bolsa (chips), con una amplia resistencia a los nematodos del quiste de la patata y un buen rendimiento.

- **Resistencia múltiple**
- **Adecuada para patatas fritas de bolsa (chips) y copos**
- **Alto contenido de materia seca**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 92-1146 x SILVESTER
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 447
Contenido de materia seca: 24%

Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 8
Nematodo dorado Ro 5: moderadamente sensible / 6
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Nematodo blanco Pa 2: resistente / 9
Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo / 8
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/arsenal

Artemis.

Tradicional
Al por menor
Frescas

Variedad semitemprana de consumo, con un excelente rendimiento e ideal para patatas fritas caseras.

- **Excelente calidad para freír**
- **Buena tolerancia a magulladuras y daños**
- **Múltiples resistencias**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: RIANTA x RENSKA
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 375

Contenido de materia seca: 20,4%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: media / 6
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 8
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/artemis

Babylon.

Tradicional
Al por menor
Frescas
Transformación
Patatas fritas, precocinadas

Variedad tardía de transformación, de carne amarilla, con un buen rendimiento y una calidad muy estable.

- **Excelente calidad para freír**
- **Resistencia a múltiples virus**
- **Buena capacidad de almacenamiento**



Caractéristiques principales

Obtentor: R.K. Bakker
Cruzamiento: AGRIA MUTANT
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6
Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 401

Contenido de materia seca: 21,7%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistencia de campo / 8
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/babylon

Beyonce.

Ecológico | Transformación
Patatas fritas de bolsa (chips), copos

Variedad semitardía para patatas fritas de bolsa (chips), con un buen contenido de materia seca, adecuada para el almacenamiento a medio plazo y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.



- **Tubérculos grandes**
- **Contenido de materia seca temprana**
- **Excelente calidad de chips**

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 94-2061 x LADY JO
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Tuberización: media / 6
Dormancia: bastante larga / 7

Peso bajo agua: 446
Contenido de materia seca: 23,9%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para chips: excelente / 8
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5

agricopotatoes.es/beyonce

Carolus.

Ecológico | Tradicional | Al por menor
Frescas

Variedad semitardía de consumo, versátil, con atractivos ojos rojos y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.



- **Para diversos usos**
- **Alto contenido de materia seca**
- **Tipo de cocción harinoso**

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AGRIA x AR 00-94-17
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 398

Contenido de materia seca: 21,6%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Calidad para chips: buena / 7
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/carolus

Chester (AR 13-2694).

Transformación
Patatas fritas de bolsa (chips), copos

Variedad semi temprana para chips resistente al G. Pallida, tamaño uniforme de los tubérculos, buen contenido de materia seca y buena tolerancia a los golpes.



- **Buena tuberización y rendimiento alto**
- **Buena calidad de frito, incluso tras una larga conservación**
- **Contenido de materia seca temprana**

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 07-4052 x ALICANTE
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: bastante corta / 5

Peso bajo agua: 446
Contenido de materia seca: 24%
Tipo de cocción: harinosa / C
Calidad para chips: excelente / 8
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo / 8
Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo / 8
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/chester

Constance.

Tradicional | Al por menor
Frescas

Variedad semitemprana de consumo, de piel amarilla brillante y carne de color amarillo claro.



- **Bonita apariencia**
- **Tubérculos de tamaño uniforme**
- **Tipo de cocción bastante firme**

Caractéristiques principales

Obtentor: J.L. Spijkman
Cruzamiento: MARABEL x AR 93-1243
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: excelente / 8

Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 358
Contenido de materia seca: 19,7%
Tipo de cocción: bastante firme / AB

agricopotatoes.es/constance

Corazon.

Tradicional

Al por menor
Frescas

Variedad semitemprana de consumo, de piel roja y con un buen rendimiento precoz.

- **Piel de excelente calidad**
- **Tipo de cocción bastante firme**
- **Buena tuberización**



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: EVOLUTION x MANITOU
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 321

Contenido de materia seca: 17,8%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 5: resistencia de campo / 8
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9

agricopotatoes.es/corazon

Diamant.

Tradicional

Variedad semitardía, versátil, con una buena tolerancia al calor, un alto rendimiento y adecuada para patatas fritas caseras.

- **Excelente calidad para freír**
- **Buena resistencia a los virus**
- **Adecuada para una segunda cosecha**



Caractéristiques principales

Obtentor: Precardi
Cruzamiento: CARDINAL MUTANT
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 420

Contenido de materia seca: 23%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente sensible / 6
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: bastante sensible / 6

agricopotatoes.es/diamant

Erika.

Al por menor
Frescas, ensaladas

Variedad temprana para ensaladas y para la venta al por menor, con un tipo de cocción firme y buena resistencia a la sarna común.

- **Bonita apariencia**
- **Tuberización alta**
- **Buena resistencia al virus Y**



Caractéristiques principales

Obtentor: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Cruzamiento: MARABEL x AR 88-0156
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: excelente / 8

Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: media / 6,5
Peso bajo agua: 337
Contenido de materia seca: 18,6%
Tipo de cocción: firme / A
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

agricopotatoes.es/erika

Esmee.

Tradicional

Al por menor
Frescas

Variedad semitemprana de consumo, de bonita piel roja, con buena tolerancia al calor y un buen rendimiento.

- **Bonita apariencia**
- **Tubérculos grandes**
- **Resistencia a múltiples virus**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LAURA x RODEO
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: excelente / 8
Tuberización: media / 6


Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 326
Contenido de materia seca: 18%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/esmee

Evolution.

Tradicional

Variedad semitemprana de consumo, con una atractiva piel roja oscura y un buen rendimiento precoz.



- **Tubérculos grandes**
- **Buena tolerancia a la sequía**
- **Resistencia múltiple a los nematodos del quiste de la patata**

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 94-0807 x AMOROSA
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: corta / 4
Peso bajo agua: 343
Contenido de materia seca: 18,9%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: moderadamente sensible / 6
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Nematodo blanco Pa 2: resistencia de campo / 7
Sarna verrugosa F1: moderadamente sensible / 8
Sarna verrugosa F6: resistente / 10

agricopotatoes.es/evolution

Fajah.

Tradicional

Variedad temprana y robusta para consumo, de tubérculos grandes y forma regular, y un contenido de materia seca relativamente alto.



- **Tubérculos grandes y alto rendimiento.**
- **Tubérculos de forma oval larga y de tamaño uniforme.**
- **Dormancia corta, adecuada para una segunda cosecha.**

Caractéristiques principales

Obtentor: R. Rispens
Cruzamiento: LANORMA x AMBITION
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 354
Contenido de materia seca: 19,4%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5

agricopotatoes.es/fajah

Feliz (SW 14-7008).

Retail
Salads

Great looks, great performance!

El poder de la innovación

Variedad semitemprana para ensalada, de tubérculos oval alargados, de carne firme a la cocción (tipo A) y alta resistencia al PVY.



- **Bonita piel**
- **Tipo de cocción A**
- **Buena resistencia al PV**

*Encontrará toda la información y los datos técnicos de la variedad spotlight en la **página 10 & 20** o escanee el código QR.*

agricopotatoes.es/feliz

Fontane.

Transformación
Patatas fritas, patatas fritas de bolsa (chips), copos

Variedad semitardía de transformación, de alto rendimiento, para la producción de patatas fritas y copos.

- **Tubérculos grandes**
- **Alto contenido de materia seca**
- **Adecuada para diferentes tipos de suelo**



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: AGRIA x AR 76-034-03
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 430
Contenido de materia seca: 23,2%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Calidad para chips: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6,5
Sarna verrugosa F1: bastante sensible / 6
Sarna verrugosa F6: moderadamente sensible / 8

agricopotatoes.es/fontane

Jolene.

Tradicional
Al por menor
Frescas

Variedad semitardía, con una bonita piel y buena capacidad de almacenamiento.

- **Adecuada para frito casero**
- **Tubérculos de forma uniforme**
- **Buen contenido de materia seca**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: SAGITTA x AR 03-1491
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 389
Contenido de materia seca: 21,1%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: buena / 7

agricopotatoes.es/jolene

Jacky.

Ecológico | **Al por menor** Patatas baby **Transformación** Precocinadas

Variedad semitemprana de consumo, de tamaño pequeño, con un alto rendimiento y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- **Tipo de cocción bastante harinoso**
- **Tuberización alta**
- **Buena tolerancia a magulladuras y daños**



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: ANOUK x ATHLETE
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: alta / 9
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 368
Contenido de materia seca: 20,1%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9


agricopotatoes.es/jacky

Kuroda.

Tradicional

Variedad semitardía de consumo, de piel roja, con una excelente tolerancia al calor y un muy buen rendimiento.

- **Tubérculos grandes**
- **Buena capacidad de almacenamiento**
- **Resistencia múltiple a la sarna verrugosa**



Caractéristiques principales

Obtentor: G. Kuik
Cruzamiento: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 426
Contenido de materia seca: 23%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: por debajo de la media / 5,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9

agricopotatoes.es/kuroda

Leonore.

Tradicional | Transformación
Patatas fritas

Variedad temprana para frito, de buen rendimiento.

- **Piel de buena calidad**
- **Buena resistencia a las virosis**
- **Tubérculos largo-ovales**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: EXCELLENCY x AR 06-3754
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 397
Contenido de materia seca: 21,5%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/leonore

Levante.

Ecológico | Tradicional | Al por menor
Frescas

Variedad semitardía de consumo, de alto rendimiento, con una bonita piel amarilla y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- **Tuberización alta**
- **Bonita piel**
- **Buena capacidad de almacenamiento**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 01-3218 x ALMERA
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: alta / 8
Dormancia: media / 6,5

Peso bajo agua: 365
Contenido de materia seca: 19,9%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: por debajo de la media / 5,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5

agricopotatoes.es/levante

Lugano.

Tradicional | Transformación
Patatas fritas

Variedad semitardía de transformación, de carne amarilla, con una buena resistencia a los nematodos del quiste de la patata y a sarna verrugosa.

- **Tubérculos grandes**
- **Resistencia múltiple**
- **Buena capacidad de almacenamiento**



Caractéristiques principales

Obtentor: F.J. Vos
Cruzamiento: AR 00-2211 x AR 99-0669
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 394
Contenido de materia seca: 21,4%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B

Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 5: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Nematodo blanco Pa 2: resistente / 9
Nematodo blanco Pa 3: resistente / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9


agricopotatoes.es/lugano

Manitou.

Tradicional | Al por menor
Frescas

Variedad tardía de consumo, con una piel roja y un alto rendimiento.

- **Tubérculos grandes**
- **Buena tolerancia a la sequía**
- **Tubérculos de tamaño uniforme**



Caractéristiques principales

Obtentor: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Cruzamiento: LAURA x MARANCA
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 351

Contenido de materia seca: 19,4%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: por debajo de la media / 5,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 5: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/manitou


Markies.

Tradicional

Transformación
Patatas fritas, patatas fritas de bolsa (chips)

Variedad tardía, versátil y de alto rendimiento, apata para la industria.

- **Excelente calidad para freír**
- **Buen contenido de materia seca**
- **Adecuada para el almacenamiento a largo plazo**



Caractéristiques principales

Obtentor: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Cruzamiento: FIANNA x AGRIA
Madurez: tardía / 4
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6,5

Peso bajo agua: 427
Contenido de materia seca: 22,8%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Calidad para chips: muy buena / 7,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente sensible / 6,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7

agricopotatoes.es/markies

Melrose.

Al por menor
Frescas, especiales

Transformación
Precocinadas

Semitardía y polivalente. Se caracteriza por su sabor intenso.

- **Tipo de cocción bastante harinoso**
- **Carne amarilla**
- **Piel roja clara**




Caractéristiques principales

Obtentor: C.R.A.
Cruzamiento: BP 15.7.70 x AM 15.1.68
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: alta / 8

Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 406
Contenido de materia seca: 22%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Sarna verrugosa F1: moderadamente sensible / 7

agricopotatoes.es/melrose



Meryem.

Tradicional

Variedad tardía de consumo, de alto rendimiento y con una bonita piel roja.



- **Buena tolerancia a la sequía**
- **Buena tuberización**
- **Buena resistencia a virus**

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: LUSA x AR 01-0420
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: muy buena / 7,5
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: corta / 4

Peso bajo agua: 349
Contenido de materia seca: 19,2%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: ligeramente sensible / 9

agricopotatoes.es/meryem

Picasso.

Tradicional

Variedad tardía de consumo, de piel amarilla, prominentes ojos rojos, buena resistencia a la sarna común y adecuada para el almacenamiento a largo plazo.



- **Alto rendimiento**
- **Buena tolerancia a la sequía**
- **Buena tolerancia a magulladuras y daños**

Caractéristiques principales

Obtentor: Duoplant V.O.F.
Cruzamiento: CARA x AUSONIA
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6
Dormancia: larga / 8

Peso bajo agua: 381
Contenido de materia seca: 20,8%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: inadecuada / 5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/picasso

Paradiso.

Tradicional

El triplete perfecto: ¡fuerte, fabulosa y abundante!

El poder de la innovación

Variedad semitardía con grandes tubérculos y con un excelente rendimiento para el mercado tradicional.



- **Tubérculos grandes**
- **Bonita apariencia**
- **Buena tolerancia al calor y a la sequía**

Encontrará toda la información y los datos técnicos de la variedad spotlight en la ***página 22*** *o escanee el código QR.*

agricopotatoes.es/paradiso

Premiere.

Transformación
Patatas fritas

Variedad muy temprana para la industria de las patatas fritas, con un buen rendimiento precoz.

- **Para suministro temprano, directamente desde el campo**
- **Alto contenido de materia seca**
- **Buena distribución de la materia seca**



Caractéristiques principales

Obtentor: Precardi
Cruzamiento: CIVA x PROVITA
Madurez: muy temprana / 8
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: bastante corta / 5

Peso bajo agua: 416
Contenido de materia seca: 22,4%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: buena / 7
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/premiere

Ranomi.

Tradicional

Al por menor
Frescas

Variedad temprana de consumo, con cierta resistencia a la sarna común y un buen rendimiento precoz.

- **Bonita piel**
- **Tubérculos grandes**
- **Tipo de cocción bastante firme**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 322
Contenido de materia seca: 17,9%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/ranomi

Riviera.

Tradicional

Variedad muy temprana de consumo, de piel atractiva, excelente tolerancia al calor, una buena resistencia a los virus y un buen rendimiento precoz.

- **Tubérculos grandes**
- **Bonita apariencia**
- **Buena resistencia a virus**



Caractéristiques principales

Obtentor: Mts. Boerhave
Cruzamiento: MINERVA x ALCMARIA
Madurez: muy temprana / 8
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: excelente / 8
Tuberización: bastante baja / 5

Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 318
Contenido de materia seca: 17,7%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10


agricopotatoes.es/riviera

Rudolph.

Tradicional

Variedad semitardía de consumo, con una atractiva piel roja, una buena tolerancia al calor y un rendimiento muy alto.

- **Carne blanca**
- **Tubérculos grandes**
- **Buena capacidad de almacenamiento**



Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: CHIEFTAIN x STIRLING
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: blanca / 4
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: bastante larga / 7
Peso bajo agua: 376

Contenido de materia seca: 20,5%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: sensible / 5,5
Sarna verrugosa F1: resistente / 10
Sarna verrugosa F6: moderadamente sensible / 8

agricopotatoes.es/rudolph

Sevas (KO 13-2242).

Tradicional

Variedad de consumo semi tardía, de grandes tubérculos ovales, buena dormancia y buena tolerancia a los golpes.

- **Rendimiento alto**
- **Buena resistencia a las virosis y a la sarna**
- **Bonita piel fina**



Caractéristiques principales

Obtentor: Konst Research B.V.
Cruzamiento: KO 06-1457 x SAVANNA
Madurez: semitardía / 5,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: bastante baja / 5,5
Dormancia: bastante larga / 7,5

Peso bajo agua: 350
Contenido de materia seca: 19,2%
Tipo de cocción: firme / A
Calidad para patatas fritas: media / 6
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/sevas

Sevilla.

Ecológico | Transformación
Patatas fritas, patatas fritas de bolsa (chips)

Variedad tardía de materia seca alta, delicioso sabor y resistente al mildiu de la hoja.

- **Resistente al mildiu**
- **Necesidad de Nitrógeno baja**
- **Buena tolerancia a la sequía**




Caractéristiques principales

Obtentor: N. Vos
Cruzamiento: AGRIA x DOB 1997-507-015
Madurez: tardía / 4,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: por debajo de la media / 5,5
Tuberización: bastante alta / 7

Dormancia: larga / 8
Peso bajo agua: 385
Contenido de materia seca: 21%
Tipo de cocción: harinosa / C
Calidad para patatas fritas: muy buena / 7,5
Calidad para chips: buena / 7
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9

agricopotatoes.es/sevilla



Sinora.

Transformación
Patatas fritas, patatas fritas de bolsa (chips)

Variedad semitemprana, fácil de cultivar y de alto rendimiento, apta para la recolección temprana para la industria de las patatas fritas o las patatas fritas de bolsa (chips).

- **Para suministro temprano, directamente desde el campo**
- **Alto contenido de materia seca**
- **Buena resistencia a virus**



Caractéristiques principales

Obtentor: J. Schilt
Cruzamiento: AGRIA x AM 70-2166
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante alta / 7
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 416
Contenido de materia seca: 22,6%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Calidad para chips: excelente / 8
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

agricopotatoes.es/sinora

Spunta.

Tradicional

Variedad semitardía de consumo, de alto rendimiento y con una buena tolerancia al calor.

- **Tubérculos grandes**
- **Tubérculos de tamaño uniforme**
- **Alto contenido de materia seca**



Caractéristiques principales

Obtentor: J. Oldenburger
Cruzamiento: BEA x USDA 96-56
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: media / 6
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 387
Contenido de materia seca: 21%
Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: media / 6
Mildiu de la hoja: sensible / 5,5
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/spunta

Twinner.

Ecológico | **Tradicional** **Al por menor** Frescas

Variedad temprana de consumo, para cultivo convencional y ecológico, resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- **Tubérculos grandes**
- **Bonita apariencia**
- **Tipo de cocción bastante firme**



Caractéristiques principales

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamiento: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: bastante baja / 5
Dormancia: media / 6

Peso bajo agua: 359
Contenido de materia seca: 19,7%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

agricopotatoes.es/twinner

Twister.

Ecológico | **Tradicional** **Al por menor** Frescas

Variedad semitemprana de consumo, para cultivo convencional y ecológico, con un buen rendimiento y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- **Bonita apariencia**
- **Buena capacidad de almacenamiento**
- **Tipo de cocción bastante firme**



Caractéristiques principales

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamiento: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Madurez: semitemprana / 7
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: bastante larga / 7
Peso bajo agua: 345

Contenido de materia seca: 19%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: moderadamente sensible / 8

agricopotatoes.es/twister

Vogue.

Tradicional

Variedad semitemprana de consumo, con tubérculos grandes y de tamaño uniforme.

- **Tipo de cocción bastante firme**
- **Tubérculos grandes**
- **Tuberización temprana**



Caractéristiques principales

Obtentor: Konst Research B.V.
Cruzamiento: MARABEL x AMOROSA
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: bastante baja / 5,5
Dormancia: bastante corta / 5

Peso bajo agua: 311
Contenido de materia seca: 17,3%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9

agricopotatoes.es/vogue

Notas.

Una mirada al futuro del cultivo de la patata

Nos complace dar a conocer una nueva generación prometedora de variedades de patata. Actualmente en las últimas fases de ensayo, estas variedades todavía no están disponibles para su comercialización, pero ya muestran un gran potencial de cara al futuro. .

Considere esta sección un avance exclusivo de lo que está por venir en el cultivo de la patata: variedades prometedoras que pronto podrían hacerse un hueco en el mercado.ket.

AR 16-0165.

Ecológico | Tradicional

Una variedad de patata de cultivo principal con una piel muy atractiva, buena tolerancia al calor, amplia resistencia a los nematodos del quiste de la patata y un alto rendimiento.



- **Tubérculos grandes, uniformes y ovalados**
- **Cocina bastante harinosa y adecuada para freír en casa**
- **Una planta robusta con un buen sistema radicular y alta resistencia al PVY**

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 07-3009 x AR 08-3398
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: - / -
Dormancia: media / 6
Peso bajo agua: 367
Contenido de materia seca: 20,1%


Tipo de cocción: harinosa / BC
Calidad para patatas fritas: - / -
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente* / 9*
Nematodo dorado Ro 2/3: resistente* / 9*
Nematodo dorado Ro 5: resistente* / 9*
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Nematodo blanco Pa 2: resistente* / 9*
Nematodo blanco Pa 3: resistente* / 9*

** Los resultados marcados con un asterisco (*) se basan en nuestra propia investigación y aún no se han publicado oficialmente.*

AR 16-1404.

Ecológico | Tradicional | Transformación
Patatas fritas

Variedad semitemprana apta para la industria, con buen tamaño y forma regular de los tubérculos.



- **Resistencia natural al mildiu de la hoja**
- **Resistente al virus Y**
- **Alta tuberización**

Caractéristiques principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamiento: AR 10-4512 x JOLENE
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: media / 6
Tuberización: - / -
Dormancia: bastante corta / 5

Peso bajo agua: 388
Contenido de materia seca: 21,1%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Sarna verrugosa F1: ligeramente sensible / 9

CR 13-3717.

Ecológico | Transformación
Patatas fritas

Variedad semitardía de tubérculos grandes, apata para la industria.



- **Variedad Next Generation+**
- **De alto rendimiento**
- **Buena tolerancia a la sarna**

Caractéristiques principales

Obtentor: Mts. Crijns-Hop
Cruzamiento: AR 07-3626 x AR 05-3409
Madurez: semitemprana / 6,5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Tuberización: - / -
Dormancia: media / 6,5

Peso bajo agua: 377
Contenido de materia seca: 20,5%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Calidad para patatas fritas: excelente / 8
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 8,5

+ Las variedades marcadas con este símbolo son variedades de Nueva Generación con genes de resistencia apilados.

PL 17-0210.

Ecológico | Transformación
Fécula

Variedad para fécula, con resistencia múltiple a nematodos y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.



- **Buena producción**
- **Alto contenido de materia seca**
- **Resistente al mildiu**

Caractéristiques principales

Obtentor: AKV Langholt
Cruzamiento: AVENANCE x PL 08-4010
Madurez: tardía / 5
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: pobre / 4,5
Tuberización: media / 6,5
Dormancia: bastante corta / 5,5
Peso bajo agua: 517
Contenido de materia seca: 27,4%

Tipo de cocción: harinosa / CD
Calidad para patatas fritas: - / -
Calidad para chips: por encima de la media / 6,5
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Nematodo dorado Ro 2/3: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 8
Nematodo blanco Pa 3: moderadamente sensible / 6

SW 15-6459.

Transformación
Precocinadas

Variedad semitemprana para venta al por menor, de tubérculos ovalados y bonita piel.

- **Apta para la industria de pelado**
- **Alto número de tubérculos por planta**
- **Cocción bastante firme**



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: REGINA x SA 06-0104
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla / 7
Finura de la piel: bastante pobre / 5
Tuberización: - / -
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 389
Contenido de materia seca: 21,1%
Tipo de cocción: bastante firme / AB
Calidad para patatas fritas: - / -
Nematodo dorado Ro 1/4: resistencia de campo / 7
Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 7
Nematodo dorado Ro 5: moderadamente sensible / 6
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5
Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

** Los resultados marcados con un asterisco (*) se basan en nuestra propia investigación y aún no se han publicado oficialmente.*

SW 16-8008.

Ecológico | Al por menor
Frescas

Una variedad de venta al por menor de alto rendimiento, de maduración media-temprana, de color amarillo, con una fuerte formación de tubérculos y resistencia a Phytophthora, lo que ofrece una amplia gama de oportunidades en el mercado de fruta fresc

- **Potencial de rendimiento muy alto con un desempeño consistentemente sólido**
- **Acabado atractivo de la piel, buena uniformidad en el tamaño de los tubérculos y buen número de tubérculos**
- **Variedad de nueva generación con un buen paquete de resistencias**



Caractéristiques principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamiento: AR 09-5135 x AR 08-3159
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: - / -
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 344
Contenido de materia seca: 18,9%
Tipo de cocción: bastante harinosa / B
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Nematodo blanco Pa 2: resistente* / 9*
Nematodo blanco Pa 3: resistencia de campo* / 7*
Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

** Los resultados marcados con un asterisco (*) se basan en nuestra propia investigación y aún no se han publicado oficialmente.*

TW 17-1410.

Ecológico | Al por menor
Frescas

Variedad semitardía de consumo, de piel roja, resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo, adecuada para la producción convencional y ecológica.

- **Alta producción**
- **Buena resistencia a virus**
- **Bonito color de piel**



Caractéristiques principales

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamiento: ALOUETTE x AR 09-4077
Madurez: semitardía / 6
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: buena / 7
Tuberización: - / -
Dormancia: bastante corta / 5
Peso bajo agua: 369
Contenido de materia seca: 19,9%
Tipo de cocción: firme / A
Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente / 10

⊕ Las variedades marcadas con este símbolo son variedades de Nueva Generación con genes de resistencia apilados.

TW 18-1401.

Ecológico | Al por menor
Especiales

Una variedad temprana de consumo, con resistencia natural al mildiu en el follaje y el tubérculo, apta para la producción convencional y ecológica

- **Cocción firme**
- **Variedad temprana de consumo**
- **Variedad de nueva generación+ con buena resistencia a virus**



Caractéristiques principales

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamiento: LORELEY x LM 11-0212
Madurez: temprana / 7,5
Color de la carne: amarilla clara / 6,5
Finura de la piel: por encima de la media / 6,5
Tuberización: - / -
Dormancia: corta / 4,5
Peso bajo agua: 350
Contenido de materia seca: 19,5%
Tipo de cocción: firme / A
Nematodo dorado Ro 1/4: resistencia de campo* / 8*
Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9
Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 6
Sarna verrugosa F1: resistente* / 10*

** Los resultados marcados con un asterisco (*) se basan en nuestra propia investigación y aún no se han publicado oficialmente.*
⊕ Las variedades marcadas con este símbolo son variedades de Nueva Generación con genes de resistencia apilados.

Genética y experiencia compartidas en todo el mundo

La actividad de Agrico va más allá de la exportación de patata de siembra de alta calidad desde los Países Bajos. Nuestra genética, nuestros conocimientos y nuestra experiencia llegan a mercados de todo el mundo.

A través de nuestras variedades exclusivas con licencia*, ayudamos a nuestros clientes a desarrollar y fortalecer sus mercados locales con variedades diferenciadas y de alto valor añadido. Desde el cultivo de tejidos in vitro, facilitamos el acceso a la robusta genética de Agrico y acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde la propagación hasta la comercialización.

Nos enorgullece presentar una selección de nuestras mejores variedades con licencia, desarrolladas para aportar valor y generar un impacto positivo en mercados de todo el mundo.

** En los Países Bajos, estas variedades no se cultivan como patatas de siembra.*



Agostino.



Allstar.



Almera.



Anouk.



Ardeche.



Basin Russet.



Bellanita.

Bente (SW 14-6968).



Corsica.



Destiny.

Excellency.



Fyone.



Janick.

Maranca.



Nofy.



Palace.

Performer.



Prince.



Roko.

Stacey.



Volare.



Nombre	Página	Cultivo	Segmento de mercado			Sellos		Características								Resistances						
								Madurez	Color de la piel	Color de la carne	Forma de los tubérculos	Contenido de materia seca	Tipo de cocción	Calidad para chips	Calidad para patatas fritas	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Mildiu de la hoja	Mildiu del tubérculo
Agata	30		✓	Frescas				8	Y	6	O	17,6	AB	4	4	9	-	-	-	-	5	6
Agria	30	✓	✓	Frescas	Patatas fritas, Chips, Precocinadas		✓	5	Y	7	OL	21,8	BC	7,5	8	9	-	-	2	2	5,5	7
Alouette	31	✓	✓	Frescas	Precocinadas	✓		6	R	7,5	OL	21,1	AB	-	6,5	9	8	4	-	-	9	9
AR 16-1404	58	✓	✓		Patatas fritas	✓		6,5	Y	7	O	21,1	AB	-	8	9	-	-	-	-	9	-
AR 16-0165	58	✓	✓			✓		5	Y	6	O	20,1	BC	-	-	9*	9*	9*	9*	9*	9	6
Arizona	31		✓					7	Y	6	O	17	AB	4	4	9	-	-	-	-	4	5
Armedi	32				Patatas fritas			5,5	Y	6	OL	21,8	C	7	8	9	7	5	9	8	4	7,5
Arsenal	32				Chips, Copos			5,5	Y	6	RO	24	BC	7	7,5	9	8	6	9	8	4,5	5,5
Artemis	33		✓	Frescas				7	Y	6	OL	20,4	B	6	6	9	-	-	-	-	5	8
Babylon	33		✓	Frescas	Patatas fritas, Chips, Precocinadas			5	Y	7	OL	21,7	BC	7	8	8	-	-	-	-	5,5	6,5
Beyonce	34	✓			Chips, Copos	✓		6	Y	6,5	OR	23,9	BC	8	7	4	-	-	-	-	8,5	7,5
Carolus	34	✓	✓	Frescas		✓		6	Y/R	7	O	21,6	BC	7	7	-	-	-	-	-	9	9
Cerisa				Ensaladas				7,5	R	7	L	21,3	A	4,5	5	-	-	-	-	-	4	7
Chester (AR 13-2694)	35				Chips, Copos			6	Y	6,5	OR	24	C	8	-	4*	2*	-	8*	7*	5	5
Constance	35		✓	Frescas				7	Y	6,5	OR	19,7	AB	4	5,5	-	-	-	-	-	5	4,5
Corazon	36		✓	Frescas				7	R	6	OL	17,8	AB	4	5,5	9	9	8	-	-	4,5	6,5
CR 13-3717	59					✓+												-				
Diamant	36		✓					6	Y	6	O	23	B	6	7	9	-	-	-	-	6	7
Erika	37			Frescas, Ensaladas				7,5	Y	6	LO	18,6	A	4	5	9	-	-	-	-	3,5	4
Esmee	37		✓	Frescas				6,5	R	7	OL	18	AB	4	6	-	-	-	-	-	4,5	7
Evolution	38		✓					6,5	R	6	OL	18,9	B	4	4,5	9	6	-	7	5	4	6
Fajah	38		✓					5,5	Y	6	LO	19,4	BC	6,5	7	9	-	-	3	2	4	5,5

Nombre	Página	Cultivo	Segmento de mercado			Sellos		Características								Resistances						
								Madurez	Color de la piel	Color de la carne	Forma de los tubérculos	Contenido de materia seca	Tipo de cocción	Calidad para chips	Calidad para patatas fritas	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Mildiu de la hoja	Mildiu del tubérculo
Feliz (SW 14-7008)	10, 20, 39			Ensaladas				7	Y	6,5	OL	19,6	A	-	-	9*	-	3*	6*	3*	3,5	5,5
Fontane	40				Patatas fritas, Chips, Copos		✓	5,5	Y	6,5	O	23,2	BC	7	7,5	9	-	-	-	-	5	6,5
Jacky	40	✓		Patatas baby	Precocinadas	✓		6,5	Y	6,5	RO	20,1	B	5	5,5	9	-	-	-	-	9	9
Jamaica (AR 14-0334)	12		✓					7,5	Y	6,5	OL	18,3	AB	-	-	1*	-	-	-	-	3,5	6
Jolene	41		✓	Frescas				6	Y	6	OL	21,1	B	5	7	-	-	-	-	-	4	5
Kuroda	41		✓					6	R	6	O	23	BC	5	5,5	9	-	-	-	-	5	5
Leonore	42				Patatas fritas			7,5	Y	7	LO	21,5	BC	-	7	9*	-	-	-	-	3,5	5
Levante	42	✓	✓	Frescas		✓		5,5	Y	6	LO	19,9	B	4,5	5,5	9	-	-	-	-	8,5	7,5
Lugano	43		✓		Patatas fritas			5,5	Y	6,5	OL	21,4	B	5,5	7	9	9	9	9	9	5	5,5
Manitou	43		✓	Frescas				5	R	6	LO	19,4	B	4,5	5,5	9	9	9	-	-	5	6
Markies	44		✓		Patatas fritas, Chips		✓	4	Y	6,5	OL	22,8	BC	7,5	8	9	-	-	-	-	6,5	7
Melrose	44			Frescas, Especiales	Precocinadas			6	R	7	O	22	B	5	6,5	-	-	-	-	-	4	-
Meryem	46		✓					5	R	6,5	LO	19,2	B	4	5,5	-	-	-	-	-	4,5	6
Napoleon	26, 45				Chips Copos			5	Y	6,5	RO	24,1	BC	8	7	9	-	-	4	2	6	6,5
Oregon (AR 14-3578)	14				Chips			5	Y	6	OR	24,9	BC	8	6,5	9*	-	-	-	-	4,5	5
Paradiso	22, 47		✓					5,5	Y	6	OL	18,2	B	4	4,5	9	-	-	-	-	5,5	6,5
Picasso	46		✓					5	Y/R	6	O	20,8	B	4	5	9	-	-	-	-	5	7
PL 17-0210	59	✓			Starch	✓		5	Y	6	RO	27,4	CD	6,5	-	9	9	4	5	6	9	8
Premiere	48				Patatas fritas			8	Y	6	OR	22,4	BC	5	6,5	9	-	-	-	-	4	6
Ranomi	48		✓	Frescas				7,5	Y	6,5	OL	17,9	AB	5	6,5	9	-	-	-	-	4	6
Riviera	49		✓					8	Y	6	OR	17,7	AB	4	4,5	9	-	-	-	-	3	5
Rudolph	49		✓					5,5	R	4	OR	20,5	AB	5,5	6,5	-	-	-	-	-	5,5	5,5

Nombre	Página	Cultivo	Segmento de mercado			Sellos		Características							Resistances						
								Madurez	Color de la piel	Color de la carne	Forma de los tubérculos	Contenido de materia seca	Tipo de cocción	Calidad para chips	Calidad para patatas fritas	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Mildiu de la hoja	Mildiu del tubérculo
Sevas	50		✓					5,5	Y	6	O	19,2	A	-	6	9*	-	-	-	-	5,5	6
Sevilla	50	✓			Patatas fritas, Chips			4,5	Y	7	O	21	C	7	7,5	-	-	-	-	-	9	-
Sidney	24, 51				Patatas fritas			6	Y	4,5	LO	21,5	B	-	6,5	9	4	4*	8	6	4	8
Sinora	52				Patatas fritas, Chips		✓	7	Y	6,5	OR	22,6	B	8	7,5	9	-	-	4	2	4,5	5
Spunta	52		✓					6	Y	6	L	21	BC	5,5	6	-	-	-	2	2	5,5	5
SW 15-6459	60				Precocinadas			6	Y	7	RO	21,10%	AB	-	-	7	7	6	-	-	3	7,5
SW 16-8008	60	✓		Frescas		✓		6	Y	6	OL	18,9	B	-	-	4*	-	-	9*	7*	9	5
Texas (AR 14-3488)	16				Patatas fritas			5,5	Y	6	OL	23	C	-	7	6*	-	-	-	-	4	5,5
TW 17-1410	61					✓+																
TW 18-1401	61	✓		Special		✓+		7,5	Y	6,5	LO	19,5	A	4	-	8*	-	-	-	-	9	6
Twinner	53	✓	✓	Frescas		✓		7,5	Y	7	O	19,7	AB	5	6,5	9	-	-	-	-	8	9
Twister	53	✓	✓	Frescas		✓		7	Y	6,5	RO	19	AB	4	5	9	-	-	-	-	9	9
Vogue	54		✓					6,5	Y	7	OL	17,3	AB	4	5	9	-	-	-	-	4	6

** Los resultados marcados con un asterisco (*) se basan en nuestra propia investigación y aún no se han publicado oficialmente.* ■

LEYENDA

Segmento de mercado

Tradicional

Retalho

• Frescas, Patatas baby, Ensaladas, Especiales

Transformación

• Patatas fritas, Patatas fritas de bolsa, Copos, Fécula

Método de cultivo

Ecológico (Apta para el cultivo ecológico)

Variedades Next Generation

Las variedades señaladas con el símbolo Next Generation tienen resistencia natural al mildiu.

Las variedades señaladas con el símbolo Next Generation tienen resistencia natural al mildiu.

Agrico Originals

Las variedades señaladas con el símbolo Agrico Originals, han desempeñado un papel clave en el cultivo mundial de la patata, marcando las diferencias.

Características de la planta y del tubérculo

Madurez	4 Tardía; 4,5 Tardía; 5 Tardía; 5,5 Semitardía; 6 Semitardía; 6,5 Semitemprana; 7 Semitemprana; 7,5 Temprana; 8 Muy temprana; 8,5 Muy temprana; 9 Muy temprana
Color claro del brote	**RV** rojo violeta **R** rojo **AV** azul violeta **V** violeta **VV** verde violeta **V** verde **VRV** verde rojo violeta **VR** verde rojo **RVV** rojo verde violeta
Color de la flor	**B** blanca **MC** morada clara **M** morada **AC** azul clara **A** azul **V** violeta **MO** morada oscura **AM** azul morada
Número de bayas	4 Muy alto; 4,5 Alto; 5 Por encima de la media; 5,5 Por encima de la media; 6 medio; 6,5 Por debajo de la media; 7 Por debajo de la media; 7,5 Bajo; 8 Ninguno
Follaje - desarrollo inicial	4 Lento; 4,5 Lento; 5 Bastante lento; 5,5 Bastante lento; 6 Medio; 6,5 Medio; 7 Bastante rápido; 7,5 Bastante rápido; 8 Rápido
Follaje - desarrollo final	4 Insuficiente; 4,5 Insuficiente; 5 Insuficiente; 5,5 Insuficiente; 6 Insuficiente; 6,5 Moderado; 7 Medio; 7,5 Bastante bueno; 8 Bueno
Follaje - firmeza	4 Frágil; 4,5 Frágil; 5 Bastante frágil; 5,5 Bastante frágil; 6 Media; 6,5 Media; 7 Bastante firme; 7,5 Bastante firme; 8 Firme
Color de la piel	**A** amarilla **R** roja **A/R** amarilla con ojos rojos **ROJ** rojiza **P** morada
Color de la carne	4 Blanca; 4,5 Blanca; 5 Crema; 5,5 Crema; 6 Amarilla clara; 6,5 Amarilla clara; 7 Amarilla; 7,5 Amarilla; 8 Amarilla intensa; 8,5 Naranja
Finura de la piel	3 Rojiza; 3,5 Rojiza; 4 Muy pobre; 4,5 Pobre; 5 Bastante pobre; 5,5 Por debajo de la medi; 6 Media; 6,5 Por encima de la media; 7 Buena; 7,5 Muy buena; 8 Excellente
Forma de los tubérculos	**R** redondo **RO** redondo oval **OR** oval redondo **O** oval **OL** oval largo **LO** largo oval **L** largo
Regularidad de la forma de los tubérculos	4 Irregular; 4,5 Irregular; 5 Bastante irregular; 5,5 Bastante irregular; 6 Bastante regular; 6,5 Bastante regular; 7 Regular; 7,5 Regular; 8 Regular
Tuberización	4 Baja; 4,5 Baja; 5 Bastante baja; 5,5 Bastante baja; 6 Media; 6,5 mMedia; 7 Bastante alta; 7,5 Bastante alta; 8 Alta; 8,5 Alta; 9 Alta
Tamaño de los tubérculos	4 Pequeño; 4,5 Pequeño; 5 Bastante pequeño; 5,5 Bastante pequeño; 6 Medio; 6,5 Medio; 7 Bastante grande; 7,5 Bastante grande; 8 Grande
Regularidad del tamaño	4 Irregular; 4,5 Irregular; 5 Bastante irregular; 5,5 Bastante irregular; 6 Bastante regular; 6,5 Bastante regular; 7 Regular; 7,5 Regular; 8 Regular
Dormancia	4 Corta; 4,5 Corta; 5 Bastante corta; 5,5 Bastante corta; 6 Media; 6,5 Media; 7 Bastante larga; 7,5 Bastante larga; 8 Larga

Sensibilidad y calidad

Crecimiento secundario; Antracnosis; Grietas de crecimiento; Daños de recolección	3 Muy sensible; 3,5 Muy sensible; 4 Muy sensible; 4,5 Muy sensible; 5 Sensible; 5,5 Sensible; 6 Bastante sensible; 6,5 Bastante sensible; 7 Ligeramente sensible; 7,5 Ligeramente sensible; 8 Ligeramente sensible a no sensible
Metribuzin pre-emergencia; Metribuzin post-emergencia	3 very sensitive; 3,5 very sensitive; 4 very sensitive; 4,5 very sensitive; 5 sensitive; 5,5 sensitive; 6 quite sensitive; 6,5 quite sensitive; 7 slightly sensitive; 7,5 slightly sensitive; 8 slightly to not sensitive
Etileno	**4** 5% menos tubérculos **4,5** 5% menos tubérculos **5** 5% menos a 5% más tubérculos **5,5** 5% menos a 5% más tubérculos **6** 5% a 15% más tubérculos **6,5** 5% a 15% más tubérculos **7** 15% a 25% más tubérculos **7,5** 15% a 25% más tubérculos **8** 25% más tubérculos

Aviso legal: *En la Unión Europea, la aprobación del principio activo metribuzina no se ha renovado y, por lo tanto, los productos fitosanitarios que la contienen ya no están autorizados. Compruebe siempre si un producto y su uso previsto están legalmente autorizados en el país de cultivo.*

Sensibilidad y calidad

Nematodos del quiste de la patata; Nematodo dorado: Ro 1, 2, 3 y 4; Nematodo blanco Pa 2 y 3	Sensibilidad relativa (%)	
	9	< 1
	8	1,1-3
	7	3,1-5
	6	5,1-10
	5	10,1-15
	4	15,1-25
	3	25,1-50
	2	50,1-100
	1	> 100
	1 sensible; 2 sensible; 3 sensible; 4 sensible; 5 moderadamente sensible; 6 moderadamente sensible; 7 resistencia de campo; 8 resistencia de campo; 9 resistente	
Mildiu de la hoja; Mildiu del tubérculo; Sarna común; Sarna pulverulenta; Fusarium; Antracnosis; Spraing (Manchas y/o círculos necróticos); Virus del enrrollado; Virus - Yn; Virus - Yntn (tubérculo)	Mildiu de la hoja; Mildiu del tubérculo; Sarna común; Sarna pulverulenta; Fusarium; Antracnosis; Spraing (Manchas y/o círculos necróticos); Virus del enrrollado; Virus - Yn; Virus - Yntn (tubérculo)	
Sarna verrugosa F1, F6, F18	1 muy sensible; 2 muy sensible; 3 muy sensible; 4 muy sensible; 5 bastante sensible; 6 bastante sensible; 7 moderadamente sensible; 8 moderadamente sensible; 9 ligeramente sensible; 10 resistente	

Los resultados marcados con un asterisco (*) se basan en nuestras propias investigaciones y aún no se han publicado oficialmente. ■

Notas.

English	Nederlands	Deutsch	Français	Español	Português
Patatas baby	Krielaardappelen	Drillinge	Grenailles	Patatas baby	Babies
Black spot (internal bruising)	Stootblauw	Schwarzfleckigkeit	Noircissement de la chair	Antracnosis	Manchas negras
Breeder	Kweker	Züchter	Obtenteur	Obtentor	Obtentor
Common scab	Schurft	Schorf	Gale commune	Sarna común	Sarna comum
Convenience	Koelvers	Fertigprodukten	4ème gamme	Precocinadas	4ª Gama
Cooking type	Kooktype	Kochtyp	Type de cuisson	Tipo de cocción	Grupo culinário
Crisps	Chips	Chips	Chips	Patatas fritas de bolsa (chips)	Rodelas
Crisping quality	Geschikt voor chips	Geeignet für Chips	Utilisation possible en Chips	Calidad para chips	Qualidade para fritura em rodelas
Crossing	Kruising	Kreuzung	Croisement	Cruzamiento	Cruzamento
Discolouration after cooking	Grauwverkleuring (na koken)	Grauverfärbung (nach dem Kochen)	Noircissement après cuisson	Coloración gris (después de la cocción)	Descoloração após cozedura
Dormancy	Kiemrust	Keimruhe	Dormance	Dormancia	Dormência
Dry matter content	Drogestofgehalte	Trockensubstanzgehalt	Matière sèche	Contenido de materia seca	Teor de matéria seca
Dry matter distribution	Drogestofverdeling	Trockenmasseverteilung	Répartition de la matière sèche	Distribución de la materia seca	Distribuição da matéria seca
Flakes	Vlokken	Flocken	Flocon	Copos	Flocos
Flesh colour	Vleeskleur	Fleischfarbe	Couleur de la chair	Color de la carne	Cor da polpa
Flower colour	Bloemkleur	Blütenfarbe	Couleur de la fleur	Color de la flor	Cor da flor
Foliage - final development	Loof - ontwikkeling volledig	Laub - Entwicklung Ende	Feuillage - développement final	Follaje - desarrollo final	Folhagem - desenvolvimento final
Foliage - firmness	Loof - stevigheid plant	Laub - Festigkeit	Feuillage - tenue	Follaje - firmeza	Firmeza da folhagem
Foliage - initial development	Loof - ontwikkeling begin	Laub - Entwicklung Anfang	Feuillage - développement initial	Follaje - desarrollo inicial	Folhagem - desenvolvimento inicial
Patatas fritas	Frites	Pommes frites	Frites	Patatas fritas	Palitos
Fresh	Vers	Frisch	Frais	Frescas	Fresco
Fries quality	Geschikt voor friet	Geeignet für Pommes	Utilisation possible en Frites	Calidad para patatas fritas	Qualidade para fritura em palitos
Growth cracks	Groeischeuren	Wachstumsrisse	Crevasses	Grietas de crecimiento	Rachamentos
Harvest damage	Rooibeschadiging	Rodebeschädigung	Dégâts d'arrachage mécanique	Daños de recolección	Danos mecânicos
Late blight - foliage	Phytophthora - loof	Krautfäule	Mildiou du feuillage	Mildiu de la hoja	Míldio da folha
Late blight - tuber	Phytophthora - knol	Braunfäule	Mildiou du tubercule	Mildiu del tubérculo	Míldio do tubérculo
Light sprout colour	Kiemkleur	Lichtkeim	Couleur du germe	Color claro del brote	Brolho de cor clara
Maturity	Rijptijd	Reifezeit	Maturité	Madurez	Maturação
Organic	Biologisch	Biologisch	Biologique	Ecológico	Biológico
Potato cyst nematodes	Aardappelmoeheid	Kartoffelzystennematoden	Nématodes	Nematodos del quiste de la patata	Nemátodes do quisto da batateira
Powdery scab	Poederschurft	Pulverschorf	Gale poudreuse	Sarna pulverulenta	Sarna pulverulenta
Processing	Verwerking	Verarbeitung	Industrie	Transformación	Indústria
Raw discolouration	Rauwverkleuring	Rohverfärbung	Grisaillement	Coloración en crudo	Descoloração em cru
Regularity of tuber shape	Regelmaat knolvorm	Regelmäßigkeit der Knollenform	Régularité de la forme	Regularidad de la forma de los tubérculos	Regularidade da forma
Regularity of tuber size	Regelmaat sortering	Größenregelmäßigkeit	Homogénéité de la taille	Regularidad del tamaño	Regularidade do calibre
Retail	Retail	Einzelhandel	Retail	Venta al por menor	Retalho
Salads	Salade	Salatsorten	Vapeur	Ensaladas	Salada
Secondary growth	Doorwas	Durchwuchs	Repousse	Crecimiento secundario	Segundos crescimentos
Skin colour	Schilkleur	Schalenfarbe	Couleur de la peau	Color de la piel	Cor da pele
Skin finish	Schilhoedanigheid	Schalenqualität	Qualité de la peau	Finura de la piel	Acabamento de pele
Especiales	Speciaal	Spezielle	Spécialité	Especiales	Especialidades
Spraing	Kringerigheid	Stippigkeit	Ferrure	Manchas y/o círculos necróticos	TRV
Starch	Zetmeel	Stärke	Fécule	Fécula	Fécula
Traditional	Traditioneel	Traditionell	Traditionelle (consommation)	Tradicional	Tradicional
Tuberisation	Knolzetting	Knollenbildung	Tubérisation	Tuberización	Tuberização
Tuber shape	Knolvorm	Knollenform	Forme du tubercule	Forma de los tubérculos	Forma dos tubérculos
Tuber size	Grofheid knollen	Knollengrösse	Grosseur des tubercules	Tamaño de los tubérculos	Calibre dos tubérculos
Underwater weight	Onderwatergewicht	Unterwassergewicht	Poids sous eau	Peso bajo agua	Peso debaixo de água
Wart disease	Wratziekte	Kartoffelkrebs	Gale verruqueuse	Sarna verrugosa	Verruga negra

Notas.

Same catalogue, different language?

This variety catalogue is available digitally in the following languages
English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | Português

agricopotatoes.es/
catalogue/english

agricopotatoes.es/
catalogue/german

agricopotatoes.es/
catalogue/spanish

agricopotatoes.es/
catalogue/french

agricopotatoes.es/
catalogue/dutch

agricopotatoes.es/
catalogue/portugese

Cultivation recommendations are available in many languages on our website or via our local partner in the relevant country.



Agrico
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
The Netherlands
T +31 (0)527 639911 / **E** info@agrico.nl
I agricopotatoes.es

ORD-2627680 | 2026-2027