


Excellency.

SEGMENT RYNKU



Uniwersalna, średnio wczesna odmiana konsumpcyjna, z ładnie wyglądającą skórą, nadająca się do robienia domowych frytek.

- » Doskonale do produkcji frytek
- » Dobry okres spoczynku
- » Duża zawartość suchej masy



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

OGÓLNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Hodowca: Agrico Research B.V.

Krzyżowanie: LADY OLYMPIA x RED ONE

Sadzonka: AR 98-1196

Prawa hodowcy: 31-12-2042

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: średnio wczesna / 6,5

Kolor kielków: czerwono-fioletowy

Kolor kwiatów: biały

Liczba jagód: średnia / 6

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7

Liście - rozwój końcowy: dość dobry / 7,5

Liście - selektywność: średnia / 6,5

Liście - twardość: dość mocne / 7

Kolor miąższu: jasnożółty / 6

Kolor skórki: żółty

Wygląd skórki: dobry / 7

Wielkość bulwy: dość duża / 7

Kształt bulwy: owalno-podłużny

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5

Zawijanie bulw: dość regularne / 6,5

Regularność wielkości: dość regularne / 6

Wrażliwość i jakość

Okres spoczynku: średni / 6,5

Metrybuzyna: bardzo wrażliwe / 4

Bentazon: wrażliwe / 5,5

Etylen: 5% mniej do 5% więcej bulw / 5

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5

Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe / 7

Czarna plamistość: nieznacznie wrażliwe / 7

Uszkodzenia podczas zbioru: wrażliwe / 5

Ciężar pod wodą: 399

Zawartość suchej masy: 21,6%

Rozkład suchej masy: dobry / 7

Poziom TGA: 4,2

Odmiana czipsowa: średnia / 6

Odmiana frytkowa: dobra / 7

Typ kulinarny: mączysty / BC

Przebarwienie: dość wrażliwe / 6

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): nieznacznie wrażliwe / 7

JAK UPRAWIAĆ

Nawożenie¹

Azot: standardowe zalecenie + 10%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie.

¹ Poziom nawożenia bazuje na analizie gleby.

Zaprawianie nasion

Prawidłowe podkielkowanie po oderwaniu górnego kielka może dać pozytywny wynik, jeśli chodzi o wiązanie bulw. Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

30/50 mm: 27 cm (50.000 roślin/ha)

Chwasty

Po wzejściu nie należy stosować metrybuzyny (Sencor), ponieważ powoduje to poważną reakcję liści i prowadzi do znacznego zmniejszenia plonu.

Fungicydy

Niezbędny jest ścisły harmonogram oprysków prewencyjnych przeciwko zarazie ziemniaczanej.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykacji należy poczekać co najmniej trzy tygodnie przed zbiorami.

Przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Na potrzeby przetwarzania nie przechowywać w temperaturze poniżej 7°C.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: - / -

Mątwik agresywny Pa 2: - / -

Mątwik agresywny Pa 3: - / -

Zaraza ziemniaczana - liście: podatne / 5

Zaraza ziemniaczana - bulwy: podatne / 5

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: podatne / 5

Fusarium: podatne / 5

Erwinia: podatne / 5

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne / 6

Nekrotyczne plamki: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - A: - / -

Wirus - X: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Wirus - Yn: nieznacznie podatne / 7

Wirus - Yntn: nieznacznie podatne / 7,5

Rak ziemniaczany F1: odporne / 10

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -