

Premiere.

VERWENDUNGSZWECK



Verarbeitung
Pommes frites

Sehr frühe Sorte für die Pommes-frites-Industrie mit gutem, frühem Ertrag.

- » Frühe Lieferung direkt ab Feld
- » Hoher Trockenmassegehalt
- » Gute Trockenheitstoleranz



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Precardi
Kreuzung: CIVA x PROVITA
Setzling: Brands 68-15
Züchterrecht: Abgelaufen

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: sehr früh / 8
Lichtkeim: rot-violett
Blütenfarbe: weiß
Anzahl Beeren: keine / 4
Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8
Laub - Entwicklung Ende: relativ gut / 7,5
Laub - Selektierbarkeit: durchschnittlich / 6,5
Laub - Festigkeit: durchschnittlich / 6

Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenfarbe: gelb
Schalenqualität: gut / 7
Knollengröße: durchschnittlich / 6,5
Knollenform: ovalrund
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6
Knollenansatz: relativ viele / 7
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Keimruhe: relativ kurz / 5
Metribuzin: empfindlich / 5
Bentazon: relativ empfindlich / 6
Ethylen: - / -

Durchwuchs: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6

Unterwassergewicht: 416
Trockenmassegehalt: 22,4%
Trockenmasseverteilung: gut / 7,5
Gehalt an Glykoalkaloiden: 2,8

Chipsqualität: ungeeignet / 5
Pommes-frites-Qualität: überdurchschnittlich / 6,5
Kochtyp: mehlig / BC
Rohverfärbung: empfindlich / 5,5
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5


www.agrico.nl/de/premiere

PFLANZVORBEREITUNG

Düngung¹

Stickstoff: Standardempfehlung.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen

Pflanzgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock. Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang ergeben sich eine starke Laubreaktion und eine gewisse Ertragsverringering.

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagerung

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für Auslieferung direkt vom Feld oder für kurze Lagerung.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenzen

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -

Weißer Nematoden Pa 2: - / -

Weißer Nematoden Pa 3: - / -

Krautfäule: sehr anfällig / 4

Knollenfäule: etwas anfällig / 6

Schorf: sehr anfällig / 4,5

Pulverschorf: anfällig / 5

Fusarium: etwas anfällig / 6

Erwinia: anfällig / 5

Schwarze Flecken: - / -

Pfropfenbildung: kaum bis nicht anfällig / 8

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 6

Virus - A: kaum bis nicht anfällig / 9

Virus - X: kaum bis nicht anfällig / 8

Virus - Yn: anfällig / 5,5

Virus - Yntn: etwas anfällig / 7,5

Warzenkrankheit F1: resistent / 10

Warzenkrankheit F6: - / -

Warzenkrankheit F18: - / -