

# Danique.

SEGMENTO DE MERCADO

V

Venta al por  
menor  
Frescas

Variedad semitemprana de consumo, con un tipo de cocción bastante firme, una bonita piel y un buen contenido de materia seca.

- ▶ Bonita apariencia
- ▶ Tubérculos de tamaño uniforme
- ▶ Múltiples resistencias



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtenteor:** Agrico Research B.V.  
**Cruzamiento:** AR 99-1184 x AR 98-1009  
**Plántula:** AR 05-1176  
**Derechos de obtenteor:** 31-12-2046

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitemprana / 7  
**Color claro del brote:** azul violeta  
**Color de la flor:** morada clara  
**Número de bayas:** por debajo de la media / 5  
**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7,5  
**Follaje - desarrollo final:** bueno / 8  
**Follaje - selectividad:** bastante difícil / 5  
**Follaje - firmeza:** media / 6

**Color de la carne:** amarilla clara / 6,5  
**Color de la piel:** amarilla  
**Finura de la piel:** buena / 7  
**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7  
**Forma de los tubérculos:** oval redondo  
**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7  
**Tuberización:** alta / 8  
**Regularidad del tamaño:** bastante regular / 6,5

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** media / 6  
**Metribuzina:** ligeramente sensible / 7,5  
**Bentazona:** ligeramente sensible a no sensible / 8  
**Etileno:** 5% menos tubérculos / 4

**Crecimiento secundario:** ligeramente sensible / 7  
**Grietas de crecimiento:** bastante sensible / 6,5  
**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible / 7  
**Daños de recolección:** sensible / 5,5

**Peso bajo agua:** 366  
**Contenido de materia seca:** 20%  
**Distribución de la materia seca:** - / -  
**Nivel de TGA:** 3,07

**Calidad para chips:** inadecuada / 4  
**Calidad para patatas fritas:** inadecuada / 4  
**Tipo de cocción:** bastante harinosa / B  
**Coloración en crudo:** bastante sensible / 6  
**Coloración gris (después de la cocción):** ligeramente sensible / 7



# CÓMO CULTIVAR

[www.agricopotatoes.com/es/danique](http://www.agricopotatoes.com/es/danique)

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar + 20%.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve calentamiento de la semilla. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

## Fungicidas


Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** sensible / 4

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** sensible / 5

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente sensible / 6,5

**Sarna común:** sensible / 5,5

**Sarna pulverulenta:** sensible / 5

**Fusarium:** sensible / 5

**Erwinia:** - / -

**Antracnosis:** muy sensible / 4

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 6

**Virus del enrollado:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** ligeramente sensible / 6,5

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente a no sensible / 8,5

**Sarna verrugosa F1:** resistente / 10

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -