

# Jolene (AR 09-2556).


SEGMENTO DE MERCADO

**T**  
Tradicional

**R**  
Retalho  
Fresco

Variedade semitardia com um bom acabamento de pele, adequada para batata frita em uso doméstico.

- ▶ Polpa amarela clara
- ▶ Adequada para vários tipos pratos
- ▶ Bom teor de matéria seca



## CARACTERÍSTICAS

### Características Gerais

**Obtento:** Agrico Research B.V.  
**Cruzamento:** SAGITTA x AR 03-1491  
**Clone:** AR 09-2556  
**Direito do obtento:** 31-12-2051

### Características da planta e dos tubérculos

**Maturação:** semitardia / 6  
**Brolho de cor clara:** vermelha  
**Cor da flor:** branca  
**Número de bagas:** superior à média / 7  
**Folhagem - desenvolvimento inicial:** bastante rápido / 7,5  
**Folhagem - desenvolvimento final:** bom / 8  
**Folhagem - seletividade:** média / 6  
**Firmeza da folhagem:** bastante firme / 7,5

**Cor da polpa:** amarela clara / 6  
**Cor da pele:** amarela  
**Acabamento de pele:** boa / 7  
**Calibre dos tubérculos:** muito grande / 7,5  
**Forma dos tubérculos:** oval alongada  
**Regularidade da forma:** regular / 7  
**Tuberização:** muito alta / 7  
**Regularidade do calibre:** regular / 7

### Sensibilidade e qualidade

**Dormência:** média / 6  
**Metribuzina:** bastante sensível / 6  
**Bentazona:** - / -  
**Etileno:** - / -

**Segundos crescimentos:** ligeiramente sensível / 7  
**Rachamentos:** ligeiramente sensível / 7  
**Manchas negras:** ligeiramente sensível / 7  
**Danos mecânicos:** bastante sensível / 6

**Peso debaixo de água:** 389  
**Teor de matéria seca:** 21,1%  
**Distribuição da matéria seca:** - / -  
**Nível TGA:** -

**Qualidade para fritura em rodelas:** inadequada / 5  
**Qualidade para fritura em palitos:** boa / 7  
**Grupo culinário:** bastante farinhenta / B  
**Descoloração em cru:** ligeiramente sensível / 7  
**Descoloração após cozedura:** bastante sensível / 6,5



[www.agricopotatoes.com/pt/jolene](http://www.agricopotatoes.com/pt/jolene)

# COMO CULTIVAR

## Fertilização<sup>1</sup>

**Azoto:** conselho padrão.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão + 10%.

<sup>1</sup> O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

## Distância de plantação

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

## Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistências

**Nemátode dourado Ro 1/4:** - / -

**Nemátode dourado Ro 2/3:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 2:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 3:** - / -

**Míldio da folha:** muito suscetível / 4

**Míldio do tubérculo:** suscetível / 5

**Sarna comum:** ligeiramente suscetível / 6

**Sarna pulverulenta:** ligeiramente suscetível / 6,5

**Fusarium:** ligeiramente suscetível / 6

**Erwinia:** - / -

**Antracnose:** - / -

**TRV:** ligeiramente suscetível / 6

**Vírus do enrolamento:** - / -

**Vírus - A:** - / -

**Vírus - X:** - / -

**Vírus - Yn:** ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

**Vírus - Yntn (tubérculo):** ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

**Verruga negra F1:** - / -

**Verruga negra F6:** - / -

**Verruga negra F18:** - / -