


# Rousseau.

SEGMENTO DE MERCADO



Variedade semitardia de pele vermelha para salada, com uma bonita forma e calibre muito regular.

- ▶ **Tuberização elevada**
- ▶ **Bonito acabamento de pele**
- ▶ **Registo oficial com a qualificação "Chair Ferme" (polpa firme)**



## CARACTERÍSTICAS

### Características Gerais

**Obtento:** Lantmännen Seed B.V.  
**Cruzamento:** CECILE x ROSAGOLD  
**Clone:** SW 08-0012  
**Direito do obtento:** 31-12-2049

### Características da planta e dos tubérculos

**Maturação:** semiprecoce / 6,5  
**Brolho de cor clara:** violeta vermelha  
**Cor da flor:** roxa  
**Número de bagas:** médio / 6  
**Folhagem - desenvolvimento inicial:** rápido / 8  
**Folhagem - desenvolvimento final:** bom / 8  
**Folhagem - seletividade:** bastante fácil / 7  
**Firmeza da folhagem:** bastante firme / 7

**Cor da polpa:** amarela clara / 6,5  
**Cor da pele:** vermelha  
**Acabamento de pele:** boa / 7  
**Calibre dos tubérculos:** muito grande / 7  
**Forma dos tubérculos:** longa oval  
**Regularidade da forma:** regular / 7  
**Tuberização:** alta / 8  
**Regularidade do calibre:** bastante regular / 6,5

### Sensibilidade e qualidade

**Dormência:** média / 6  
**Metribuzina:** bastante sensível / 6  
**Bentazona:** - / -  
**Etileno:** 5% menos tubérculos / 4

**Segundos crescimentos:** sensível / 5,5  
**Rachamentos:** ligeiramente sensível / 7  
**Manchas negras:** ligeiramente sensível / 7,5  
**Danos mecânicos:** ligeiramente sensível / 7,5

**Peso debaixo de água:** 378  
**Teor de matéria seca:** 20,6%  
**Distribuição da matéria seca:** - / -  
**Nível TGA:** 5,9

**Qualidade para fritura em rodelas:** inadequada / 4  
**Qualidade para fritura em palitos:** inadequada / 4,5  
**Grupo culinário:** bastante firme / AB  
**Descoloração em cru:** sensível / 5  
**Descoloração após cozedura:** ligeiramente sensível / 7



# COMO CULTIVAR

[www.agricopotatoes.com/pt/rousseau](http://www.agricopotatoes.com/pt/rousseau)

## Fertilização<sup>1</sup>

**Azoto:** conselho padrão.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão + 20%.

<sup>1</sup> O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

## Distância de plantação

30/40 mm: 20-22 cm (65.000 plantas/ha)

40/50 mm: 22-26 cm (55.000 plantas/ha)

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

## Fungicidas


É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para períodos longos de armazenamento.



# Say potato, say Agrico.

## Resistências

**Nemátode dourado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nemátode dourado Ro 2/3:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 2:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 3:** - / -

**Míldio da folha:** muito suscetível / 4,5

**Míldio do tubérculo:** suscetível / 5

**Sarna comum:** ligeiramente suscetível / 6

**Sarna pulverulenta:** ligeiramente suscetível / 6,5

**Fusarium:** ligeiramente suscetível / 6,5

**Erwinia:** - / -

**Antracnose:** ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

**TRV:** muito suscetível / 4,5

**Vírus do enrolamento:** - / -

**Vírus - A:** - / -

**Vírus - X:** - / -

**Vírus - Yn:** ligeiramente suscetível / 7,5

**Vírus - Yntn (tubérculo):** ligeiramente suscetível / 6

**Verruga negra F1:** - / -

**Verruga negra F6:** - / -

**Verruga negra F18:** - / -