

Aztec Gold (ARD 10-5206).

SEGMENT DE MARCHÉ



Variété de conservation diploïde à chair orange, à la teneur en matière sèche relativement élevée, et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- ▶ Tubercules de taille très uniforme
- ▶ Convient pour différents plats
- ▶ Bonne dormance



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : ARD 04-4433 x ARD 03-2128
Numéro de clone : ARD 10-5206
Droits d'obteneur : En attente

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : tardive / 5
Couleur du germe : -
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez faible / 5,5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : assez bon / 7,5
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7,5

Couleur de la chair : orange / 8,5
Couleur de la peau : jaune
Finition de la peau : assez lisse / 6,5
Taille du tubercule : moyen / 6,5
Forme du tubercule : oblong
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : moyenne / 6
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6

Sensibilité et qualité

Dormance : longue / 8
Métribuzine : - / -
Bentazone : - / -
Éthylène : - / -

Repousse : assez sensible / 6,5
Crevasses : assez sensible / 6,5
Coups bleus : peu à pas sensible / 8
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7

Poids sous eau : 395
Matière sèche : 21,4%
Répartition de la matière sèche : - / -
Niveau de glyco-alcaloïde : 1,3

Chipabilité : supérieure à la moyenne / 6,5
Fritabilité : bonne / 7
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Grisaillement : peu à pas sensible / 8
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7,5

PRODUCTION

Fertilisation¹

Azote : conseil standard + 5%.

Phosphore : conseil standard.

Potasse : conseil standard + 20%. L'application de chlorure de potassium n'est pas recommandée car cela affecte la teneur en matière sèche des tubercules.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.

Densité de plantation

28/35 mm : 20 cm (67.000 plantes/ha)

35/55 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine (Sencor), car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Fongicides

Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Conservation

La température de stockage conseillée est de 6 °C. Convient à stockage à long terme.



Say potato,
say Agrico.

Résistances

Nématode doré Ro 1/4 : sensible* / 4*

Nématode doré Ro 2/3 : - / -

Nématode blanc Pa 2 : - / -

Nématode blanc Pa 3 : - / -

Mildiou du feuillage : peu à pas sensible / 9

Mildiou du tubercule : peu à pas sensible / 9

Gale commune : sensible / 5,5

Gale poudreuse : - / -

Fusariose : très sensible / 4

Erwinia : - / -

Dartrose : - / -

Virus du mop top : peu à pas sensible / 8

Virus - Enroulement : - / -

Virus - A : - / -

Virus - X : - / -

Virus - Y : très sensible / 4

Virus - Y nécrotique : - / -

Galle verruqueuse F1 : - / -

Galle verruqueuse F6 : - / -

Galle verruqueuse F18 : - / -

* = Ces résultats sont le fruit de nos propres recherches et ne sont pas pour le moment officiels