

Manitou.

Kasna sorta atraktivne boje
pokožice i visokog prinosa.

- ▶ Krupni gomolji
- ▶ Dobra otpornost na sušu
- ▶ Otporan na više tipova krumpirove
cistolike nematode

TRŽIŠNA NAMJENA

 Tradicionalna

 Maloprodaja
Svježa



KARAKTERISTIKE

Opće karakteristike

Uzgajivač: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Križanje: LAURA x MARANCA
Sjeme: MA 96-0419

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: kasna berba / 5
Boja klice: crveno ljubičasta
Boja cvijeta: ljubičasta
Broj bobica: ispod prosjeka / 5
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7

Boja mesa: svjetložuta / 6
Boja pokožice: crvena
Glatkoća pokožice: dobar / 7
Krupnoća gomolja: krupan / 8
Oblik gomolja: izduženo ovalan
Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6,5
Tuberizacija: umjereno velik / 7
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: umjereno kratka / 5,5
Metribuzin: vrlo osjetljiv / 4
Bentazon: malo osjetljiv / 7

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5
Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6
Nagnječenje (unutarnje): malo osjetljiv / 7,5
Oštećenje prilikom berbe: osjetljiv / 5,5

Podvodna težina: 351
Postotak suhe tvari: 19,4%
Raspodjela suhe tvari: - / -
TGA razina: 3,4

Kulinarski tip: umjereno brašnast / B
Oksidacija sirovog krumpira: - / -
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7



KAKO UZGOJITI

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 10%.

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Postupanje sa sjemenom

Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Nemojte koristiti metribuzin (Sencor) nakon nicanja jer uzrokuje jaku reakciju na lišću i znatno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: otporan / 9

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 6

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Prašasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 7

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 7

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 6,5

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 7

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -