

# Picasso.

SEGMENTO DE MERCADO



Variedade semitardia de pele amarela, com olhos vermelhos proeminentes, boa resistência à sarna comum e aptidão para longos períodos de armazenamento.

- ▶ Elevado rendimento
- ▶ Boa tolerância à seca
- ▶ Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos.



## CARACTERÍSTICAS

### Características Gerais

**Obtento:** Duoplant V.O.F.  
**Cruzamento:** CARA x AUSONIA  
**Clone:** HB 81-0036  
**Direito do obtento:** 31-12-2022

### Características da planta e dos tubérculos

**Maturação:** tardia / 5  
**Brolho de cor clara:** violeta vermelha  
**Cor da flor:** branca  
**Número de bagas:** nenhuma / 4  
**Folhagem - desenvolvimento inicial:** médio / 6,5  
**Folhagem - desenvolvimento final:** bom / 8  
**Folhagem - seletividade:** bastante fácil / 7  
**Firmeza da folhagem:** bastante firme / 7,5

**Cor da polpa:** amarela clara / 6  
**Cor da pele:** amarela com olhos vermelhos  
**Acabamento de pele:** média / 6  
**Calibre dos tubérculos:** grande / 8  
**Forma dos tubérculos:** oval redonda  
**Regularidade da forma:** bastante regular / 6  
**Tuberização:** média / 6  
**Regularidade do calibre:** regular / 7

### Sensibilidade e qualidade

**Dormência:** longa / 8  
**Metribuzina:** bastante sensível / 6  
**Bentazona:** - / -  
**Etileno:** 5% menos a 5% mais tubérculos / 5

**Segundos crescimentos:** bastante sensível / 6,5  
**Rachamentos:** bastante sensível / 6  
**Manchas negras:** ligeiramente sensível / 7  
**Danos mecânicos:** bastante sensível / 6,5

**Peso debaixo de água:** 381  
**Teor de matéria seca:** 20,8%  
**Distribuição da matéria seca:** - / -  
**Nível TGA:** 1,9

**Qualidade para fritura em rodelas:** inadequada / 4  
**Qualidade para fritura em palitos:** inadequada / 5  
**Grupo culinário:** bastante farinhenta / B  
**Descoloração em cru:** - / -  
**Descoloração após cozedura:** bastante sensível / 6,5



[www.agricopotatoes.com/pt/picasso](http://www.agricopotatoes.com/pt/picasso)

# COMO CULTIVAR

## Fertilização<sup>1</sup>

**Azoto:** conselho padrão + 5%.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão.

<sup>1</sup> O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos. Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

## Distância de plantação

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem e alguma perda de rendimento.

## Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para períodos longos de armazenamento.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistências

**Nemátode dourado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nemátode dourado Ro 2/3:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 2:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 3:** - / -

**Míldio da folha:** suscetível / 5

**Míldio do tubérculo:** ligeiramente suscetível / 7

**Sarna comum:** ligeiramente suscetível / 7

**Sarna pulverulenta:** suscetível / 5

**Fusarium:** ligeiramente suscetível / 7

**Erwinia:** suscetível / 5

**Antracnose:** - / -

**TRV:** suscetível / 5

**Vírus do enrolamento:** suscetível / 5

**Vírus - A:** - / -

**Vírus - X:** ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

**Vírus - Yn:** ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

**Vírus - Yntn (tubérculo):** suscetível / 5

**Verruga negra F1:** resistente / 10

**Verruga negra F6:** bastante suscetível / 5

**Verruga negra F18:** - / -