

# Ranomi.

SEGMENTO DE MERCADO



Tradicional


**Venta al por  
menor**  
Frescas

Variedad temprana de consumo, con cierta resistencia a la sarna común y un buen rendimiento precoz.

- ▶ **Bonita piel**
- ▶ **Tubérculos grandes**
- ▶ **Tipo de cocción bastante firme**



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtenteor:** Agrico Research B.V.

**Cruzamiento:** AR 93-033-79 x AR 95-0319

**Plántula:** AR 03-0221

**Derechos de obtenteor:** 31-12-2044

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** temprana / 7,5

**Color claro del brote:** rojo violeta

**Color de la flor:** blanca

**Número de bayas:** medio / 6

**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7,5

**Follaje - desarrollo final:** medio / 7

**Follaje - selectividad:** media / 6

**Follaje - firmeza:** media / 6,5

**Color de la carne:** amarilla clara / 6,5

**Color de la piel:** amarilla

**Finura de la piel:** buena / 7

**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7

**Forma de los tubérculos:** oval largo

**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7

**Tuberización:** media / 6

**Regularidad del tamaño:** regular / 7

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** media / 6

**Metribuzina:** bastante sensible / 6

**Bentazona:** ligeramente sensible / 7

**Etileno:** 5% a 15% más tubérculos / 6

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6

**Grietas de crecimiento:** bastante sensible / 6,5

**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible a no sensible / 8

**Daños de recolección:** bastante sensible / 6

**Peso bajo agua:** 322

**Contenido de materia seca:** 17,9%

**Distribución de la materia seca:** - / -

**Nivel de TGA:** 4,08

**Calidad para chips:** inadecuada / 5

**Calidad para patatas fritas:** por encima de la media / 6,5

**Tipo de cocción:** bastante firme / AB

**Coloración en crudo:** - / -

**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6



[www.agricopotatoes.com/es/ranomi](http://www.agricopotatoes.com/es/ranomi)

# CÓMO CULTIVAR

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar. Preferiblemente como aplicación fraccionada, con el segundo tratamiento poco después de la tuberización.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar + 10%.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve calentamiento de la semilla. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje y alguna reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para la entrega directa desde el campo o el almacenamiento a corto plazo.



# Say potato, say Agrico.

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** muy sensible / 4

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente sensible / 6

**Sarna común:** ligeramente sensible / 6,5

**Sarna pulverulenta:** muy sensible / 4,5

**Fusarium:** sensible / 5

**Erwinia:** - / -

**Antracnosis:** ligeramente sensible / 7

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 6,5

**Virus del enrollado:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** sensible / 5,5

**Virus - Yn:** sensible / 5,5

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente sensible / 6

**Sarna verrugosa F1:** resistente / 10

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -