

Zafira.

MARKTSEGMENT



Een middenlaet, hoog opbrengend consumptieras met een goede hitteresistentie.

- » Grove knollen
- » Mooie presentatie
- » Goede schurft- en virusresistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
 Kruising: ARMUNDO x AR 85-022-07
 Zaailing: AR 92-0314
 Kwekersrecht: 31-12-2034

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaet / 6
 Kiemkleur: rood paars
 Bloemkleur: licht paars
 Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: makkelijk / 8
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
 Schilkleur: geel
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolgrootte: grof / 8
 Knolvorm: ovaal
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: gemiddeld / 6
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
 Metribuzin: zeer gevoelig / 4
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: - / -
 Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: weinig gevoelig / 7
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
 Blauwgevoeligheid: gevoelig / 5
 Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 323
 Drogestofgehalte: 17,9%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: 4,8

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
 Kooktype: vrij vastkokend / AB
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/zafira

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: zeer vatbaar / 4

Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 3

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6,5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -