



Paradiso.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γενικής Χρήσης

Μεσοόψιμη, υψηλής απόδοσης,
κατάλληλη για γενική χρήση.

- ▶ Υψηλές αποδόσεις, μεγάλοι ομοιόμορφοι κόνδυλοι
- ▶ Εξαιρετική εμφάνιση, ιδανική για φούρνο
- ▶ Καλή αντοχή στους μηχανικούς χειρισμούς



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: M. Pot & M. Klaver

Διασταύρωση: RODEO x VALOR

Σπορόφυτο: PK 06-0108

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2048

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5

Χρώμα φύτρου: κόκκινο

Χρώμα άνθους: μωβ

Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 6,5

Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5

Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5

Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6,5

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: μέτριος / 6

Metribuzin (Sencor): ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Bentazon: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Αιθυλένιο: 5% έως 15% περισσότεροι κόνδυλοι / 6

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Βάρος εντός νερού: 329

Στερεά ουσία: 18,2%


Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5



agricopotatoes.gr/paradiso

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -20%. Κατά προτίμηση σε χωριστές εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Να αποφεύγεται σπάσιμο των φύτρων, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 22-24 cm (55.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 32-34 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 4 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητες

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Περωνόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5,5

Περωνόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Φουζάριο: ευαίσθητη / 5

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ευαίσθητη / 5,5

Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -