

Agata.

SEGMENT DE MARCHÉ

T
Traditionnelle
(consommation)

R
Retail
Frais

Une variété primeur de consommation courante plébiscitée pour sa qualité de peau et son niveau de rendement.

- » Tubercules de forme et calibre très homogènes
- » Bonne résistance aux virus
- » Très peu sensible aux endommagements à la récolte



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur : Lantmännen Seed B.V.

Croisement : BM 72-0052 x SIRCO

Numéro de clone : GE 77-0134

Droits d'obteneur : Expiré

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : très hâtive / 8

Couleur du germe : rouge violet

Couleur de la fleur : blanche

Nombre de baies : assez faible / 5

Feuillage - développement initial : rapide / 8

Feuillage - développement final : bon / 8

Feuillage - épuration : normale / 6,5

Feuillage - tenue : moyenne / 6

Couleur de la chair : jaune beurre / 6

Couleur de la peau : jaune

Finition de la peau : excellente / 8

Taille du tubercule : assez gros / 7

Forme du tubercule : oblong

Régularité de la forme : régulière / 7

Tubérisation : élevée / 8

Homogénéité de la taille : assez régulière / 6

Sensibilité et qualité

Dormance : courte / 4

Métribuzine : assez sensible / 6

Bentazone : - / -

Éthylène : 5% de tubercules en moins à 5% en plus / 5

Repousse : assez sensible / 6

Crevasses : assez sensible / 6

Coups bleus : peu à pas sensible / 8

Endommagement à la récolte : peu sensible / 7

Poids sous eau : 316

Matière sèche : 17,6%

Répartition de la matière sèche : - / -

Niveau de glyco-alcaloïde : 8

Chipabilité : mauvaise / 4

Fritabilité : mauvaise / 4

Type de cuisson : assez ferme / AB

Grisaillement : assez sensible / 6,5

Noircissement après cuisson : assez sensible / 6


www.agrico.nl/fr/agata

PRODUCTION

Fertilisation¹

Azote : conseil standard + 20%. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore : conseil standard.

Potasse : conseil standard.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.

Densité de plantation

28/35 mm : 20 cm (67.000 plantes/ha)

35/50 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine (Sencor) peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Fongicides

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Conservation

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à stockage à long terme.



Say potato,
say **Agrico.**

Résistances

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3 : - / -

Nématode blanc Pa 2 : - / -

Nématode blanc Pa 3 : - / -

Mildiou du feuillage : sensible / 5

Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : sensible / 5

Gale poudreuse : peu sensible / 6

Fusariose : sensible / 5

Erwinia : sensible / 5

Dartrose : peu sensible / 6,5

Virus du mop top : peu sensible / 6,5

Virus - Enroulement : peu sensible / 6

Virus - A : - / -

Virus - X : sensible / 5

Virus - Y : peu sensible / 7

Virus - Y nécrotique : peu à pas sensible / 8

Galle verruqueuse F1 : résistant / 10

Galle verruqueuse F6 : - / -

Galle verruqueuse F18 : - / -