


Next Generation

Levante.

Variedad semitardía de consumo, de alto rendimiento, con una bonita piel amarilla y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- » Tuberización alta
- » Bonita piel
- » Buena capacidad de almacenamiento

SEGMENTO DE MERCADO



CARACTERÍSTICAS

Características generales

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamiento: AR 01-3218 x ALMERA

Plántula: AR 07-3009

Derechos de obtentor: 31-12-2048

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 5,5

Color claro del brote: verde rojo

Color de la flor: blanca

Número de bayas: por debajo de la media / 5,5

Follaje - desarrollo inicial: bastante rápido / 7

Follaje - desarrollo final: bueno / 8

Follaje - selectividad: media / 6

Follaje - firmeza: bastante firme / 7

Color de la carne: amarilla clara / 6

Color de la piel: amarilla

Finura de la piel: buena / 7

Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7

Forma de los tubérculos: largo oval

Regularidad de la forma de los tubérculos: bastante regular / 6,5

Tuberización: alta / 8

Regularidad del tamaño: regular / 7

Sensibilidad y calidad

Dormancia: media / 6,5

Metribuzina: ligeramente sensible / 7

Bentazona: ligeramente sensible / 7

Etileno: 5% menos tubérculos / 4

Crecimiento secundario: ligeramente sensible / 7

Grietas de crecimiento: ligeramente sensible / 7

Manchas negras (magulladuras internas): bastante sensible / 6,5

Daños de recolección: bastante sensible / 6

Peso bajo agua: 365

Contenido de materia seca: 19,9%

Distribución de la materia seca: - / -

Nivel de TGA: 4,73

Calidad para chips: inadecuada / 4,5

Calidad para patatas fritas: por debajo de la media / 5,5

Tipo de cocción: bastante harinosa / B

Coloración en crudo: sensible / 5,5

Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7


www.agricopotatoes.com/es/levante

CÓMO CULTIVAR

Fertilización¹

Nitrógeno: recomendación estándar.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar.

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

Tratamiento de semillas

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve calentamiento de la semilla. Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.500 plantas/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

A pesar de la resistencia al mildiu, hay que estar alerta a las infecciones.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio y largo plazo.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistencias

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: - / -

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -

Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 8,5

Mildiu del tubérculo: ligeramente sensible / 7,5

Sarna común: sensible / 5

Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 6,5

Fusarium: ligeramente sensible / 6

Erwinia: - / -

Antracnosis: ligeramente sensible / 7,5

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): muy sensible / 4,5

Virus del enrollado: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: ligeramente sensible / 6

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente a no sensible / 8,5

Sarna verrugosa F1: - / -

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -