

# Laudine.


SEGMENT DE MARCHÉ

**T**  
Traditionnelle  
(consommation)

**R**  
Retail  
Frais

Une pomme de terre primeur de consommation, à la belle peau, parfaite pour la vente au détail et pour les frites maison.

- ▶ **Bel aspect**
- ▶ **Cuisson assez ferme**
- ▶ **Bonnes résistances contre les nématodes à kystes et les virus de la pomme de terre**



## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques générales

**Obtenteur** : Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft  
**Croisement** : LADY FELICIA x B 92/135/267  
**Numéro de clone** : NO 02-0562  
**Droits d'obteneur** : 31-12-2046

### Caractéristiques de la plante et des tubercules

**Maturité** : demi-hâtive / 6,5  
**Couleur du germe** : rouge violet  
**Couleur de la fleur** : blanche  
**Nombre de baies** : nul / 4  
**Feuillage - développement initial** : plutôt rapide / 7,5  
**Feuillage - développement final** : bon / 8  
**Feuillage - épuration** : plutôt facile / 7,5  
**Feuillage - tenue** : plutôt ferme / 7,5

**Couleur de la chair** : jaune / 7  
**Couleur de la peau** : jaune  
**Finition de la peau** : lisse / 7  
**Taille du tubercule** : assez gros / 7  
**Forme du tubercule** : oblong long  
**Régularité de la forme** : régulière / 7  
**Tubérisation** : assez élevée / 7  
**Homogénéité de la taille** : régulière / 7

### Sensibilité et qualité

**Dormance** : assez longue / 7  
**Métribuzine** : peu sensible / 7  
**Bentazone** : peu à pas sensible / 8  
**Éthylène** : 15% à 25% de tubercules en plus / 7

**Repousse** : assez sensible / 6  
**Crevasses** : assez sensible / 6,5  
**Coups bleus** : peu sensible / 7,5  
**Endommagement à la récolte** : sensible / 5

**Poids sous eau** : 345  
**Matière sèche** : 19%  
**Répartition de la matière sèche** : - / -  
**Niveau de glyco-alcaloïde** : 3,7

**Chipabilité** : supérieure à la moyenne / 6,5  
**Fritabilité** : très bonne / 7,5  
**Type de cuisson** : assez ferme / AB  
**Grisaillement** : peu à pas sensible / 8  
**Noircissement après cuisson** : peu sensible / 7



[www.agrico.nl/fr/laudine](http://www.agrico.nl/fr/laudine)

# PRODUCTION

## Fertilisation<sup>1</sup>

**Azote** : conseil standard + 5%.

**Phosphore** : conseil standard.

**Potasse** : conseil standard + 10%.

<sup>1</sup> Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

## Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.

## Densité de plantation

28/35 mm : 22 cm (60.500 plantes/ha)

35/55 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha)

## Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine (Sencor) peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

## Fongicides

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

## Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

## Conservation

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à stockage à long terme.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Résistances

**Nématode doré Ro 1/4** : résistante / 9

**Nématode doré Ro 2/3** : résistante / 9

**Nématode blanc Pa 2** : - / -

**Nématode blanc Pa 3** : - / -

**Mildiou du feuillage** : sensible / 5

**Mildiou du tubercule** : sensible / 5

**Gale commune** : sensible / 5,5

**Gale poudreuse** : peu sensible / 7

**Fusariose** : peu à pas sensible / 8

**Erwinia** : - / -

**Dartrose** : très sensible / 3,5

**Virus du mop top** : très sensible / 4

**Virus - Enroulement** : - / -

**Virus - A** : - / -

**Virus - X** : sensible / 5,5

**Virus - Y** : peu à pas sensible / 8

**Virus - Y nécrotique** : peu à pas sensible / 8

**Galle verruqueuse F1** : assez résistant / 9

**Galle verruqueuse F6** : - / -

**Galle verruqueuse F18** : - / -