

Chateau.

MARKTSEGMENT

R

Retail
Salade

Een vroeg saladeras met een goede knolzetting en een redelijk onderwatergewicht.

- » Goede schilkwiteit
- » Predikaat chair ferme
- » Goede knolzetting



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: MA 98-0322 x AR 98-0341
Zaailing: AR 05-1443
Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: lang ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: hoog / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
Bentazon: weinig gevoelig / 7,5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groei scheuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging: gevoelig / 5

Onderwatergewicht: 350
Drogestofgehalte: 19,2%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 4,2

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7,5
Gruwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7,5


www.agrico.nl/chateau

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/40 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4,5

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -