

Nomade.

VERWENDUNGSZWECK



Verarbeitung
Stärke

Späte Stärkesorte mit guter Resistenz gegen Kartoffelnematoden und gutem Ertrag.

- » Guter Stärkegehalt
- » Relativ frühe Erträge
- » Mehrfache Resistenzen



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Mts. Boerhave

Kreuzung: ELLES x AM 78-3704

Setzling: BH 85-0165

Züchterrecht: 31-12-2025

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 5

Lichtkeim: blau-violett

Blütenfarbe: lila

Anzahl Beeren: unterdurchschnittlich / 5

Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7

Laub - Entwicklung Ende: durchschnittlich / 7

Laub - Selektierbarkeit: relativ einfach / 7

Laub - Festigkeit: fest / 8

Fleischfarbe: cremefarben / 5

Schalenfarbe: gelb

Schalenqualität: relativ schlecht / 5

Knollengröße: groß / 8

Knollenform: ovalrund

Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6

Knollenansatz: relativ viele / 7

Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7

Empfindlichkeit und Qualität

Keimruhe: durchschnittlich / 6

Metribuzin: leicht empfindlich / 7

Bentazon: - / -

Ethylen: - / -

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6

Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7

Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6

Ernteschäden: relativ empfindlich / 6

Unterwassergewicht: 482

Trockenmassegehalt: 25,7%

Trockenmasseverteilung: - / -

Gehalt an Glykoalkaloiden: 14,8

Chipsqualität: ungeeignet / 4,5

Pommes-frites-Qualität: durchschnittlich / 6

Kochtyp: mehlig / C

Rohverfärbung: - / -

Grauverfärbung (nach dem Kochen): empfindlich / 5


www.agrico.nl/de/nomade

PFLANZVORBEREITUNG

Düngung¹

Stickstoff: Standardempfehlung + 5%.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen

Pflanzgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen. Einmalige Abkeimung ist möglich.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang kann sich eine Laubreaktion, aber nur selten eine Ertragsverringering ergeben.

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagerung

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenzen

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: moderat anfällig / 6

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: teilweise resistent / 7

Weißer Nematoden Pa 2: teilweise resistent / 8

Weißer Nematoden Pa 3: resistent / 9

Krautfäule: sehr anfällig / 4

Knollenfäule: etwas anfällig / 7

Schorf: etwas anfällig / 6

Pulverschorf: - / -

Fusarium: etwas anfällig / 6

Erwinia: anfällig / 5

Schwarze Flecken: - / -

Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 6,5

Virus - A: kaum bis nicht anfällig / 8,5

Virus - X: etwas anfällig / 7

Virus - Yn: etwas anfällig / 6

Virus - Yntn: etwas anfällig / 6

Warzenkrankheit F1: resistent / 10

Warzenkrankheit F6: moderat anfällig / 7

Warzenkrankheit F18: - / -