

# Rousseau.


SEGMENTO DE MERCADO

V

Venta al por  
menor  
Ensaladas

Variedad semitemprana para ensaladas, de piel roja, con una bonita forma y un tamaño muy regular.

- ▶ Tuberización alta
- ▶ Bonita piel
- ▶ Registro oficial «chair ferme» (carne firme)



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtendor:** Lantmännen Seed B.V.  
**Cruzamiento:** CECILE x ROSAGOLD  
**Plántula:** SW 08-0012  
**Derechos de obtendor:** 31-12-2049

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitemprana / 6,5  
**Color claro del brote:** rojo violeta  
**Color de la flor:** morada  
**Número de bayas:** medio / 6  
**Follaje - desarrollo inicial:** rápido / 8  
**Follaje - desarrollo final:** bueno / 8  
**Follaje - selectividad:** bastante fácil / 7  
**Follaje - firmeza:** bastante firme / 7

**Color de la carne:** amarilla clara / 6,5  
**Color de la piel:** roja  
**Finura de la piel:** buena / 7  
**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7  
**Forma de los tubérculos:** largo oval  
**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7  
**Tuberización:** alta / 8  
**Regularidad del tamaño:** bastante regular / 6,5

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** media / 6  
**Metribuzina:** bastante sensible / 6  
**Bentazona:** - / -  
**Etileno:** 5% menos tubérculos / 4

**Crecimiento secundario:** sensible / 5,5  
**Grietas de crecimiento:** ligeramente sensible / 7  
**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible / 7,5  
**Daños de recolección:** ligeramente sensible / 7,5

**Peso bajo agua:** 378  
**Contenido de materia seca:** 20,6%  
**Distribución de la materia seca:** - / -  
**Nivel de TGA:** 5,9

**Calidad para chips:** inadecuada / 4  
**Calidad para patatas fritas:** inadecuada / 4,5  
**Tipo de cocción:** bastante firme / AB  
**Coloración en crudo:** sensible / 5  
**Coloración gris (después de la cocción):** ligeramente sensible / 7



[www.agricopotatoes.com/es/rousseau](http://www.agricopotatoes.com/es/rousseau)

# CÓMO CULTIVAR

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar + 20%.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve calentamiento de la semilla. Quitar los brotes puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

30/40 mm: 20-22 cm (65.000 plantas/ha)

40/50 mm: 22-26 cm (55.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.



# Say potato, say Agrico.

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** muy sensible / 4,5

**Mildiu del tubérculo:** sensible / 5

**Sarna común:** ligeramente sensible / 6

**Sarna pulverulenta:** ligeramente sensible / 6,5

**Fusarium:** ligeramente sensible / 6,5

**Erwinia:** - / -

**Antracnosis:** ligeramente a no sensible / 8

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** muy sensible / 4,5

**Virus del enrollado:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** ligeramente sensible / 7,5

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente sensible / 6

**Sarna verrugosa F1:** - / -

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -