

Laudine.

MARKTSEGMENT




Traditioneel

Retail
Vers

Een midden vroeg consumptieras met een mooie huid, geschikt voor de retail en thuisfrites.

- » Mooie presentatie
- » Vrij vastkokend
- » Goede resistentie tegen aardappelmoeheid en virus



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Kruising: LADY FELICIA x B 92/135/267
Zaailing: NO 02-0562
Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: vrij gemakkelijk / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: geel / 7
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij lang / 7
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschadiging: gevoelig / 5

Onderwatergewicht: 345
Drogestofgehalte: 19%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 3,7

Chipskwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: weinig tot niet gevoelig / 8
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/laudine

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 3,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: vatbaar / 5,5

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -