

Anosta.

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Frites

Een midden vroeg verwerkingsras
met een goede opbrengst, geschikt
voor vroege verwerking.

- » Vrij grove knollen
- » Goed onderwatergewicht
- » Midden late rijptijd



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: L. Stol
Kruising: OSTARA x PROVITA
Zaailing: ST 64-65
Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6

Vleeskleur: crème / 5,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij onregelmatig / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: - / -

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Groei scheuren: weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 390
Drogestofgehalte: 21,2%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
Frietkwaliteit: goed / 7
Kooktype: kruimig / BC
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/anosta

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 4

Fusarium: vatbaar / 5

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: vatbaar / 5,5

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -