

Cerisa.


MARKNADSSEGMENT



Matpotatis
Matpotatis

En tidig, liten knöl med rött skal, som är en specialsart för sallad och som har en utmärkt smak.

- ▶ Mycket hög knölsättning
- ▶ Utmärkta smak- och koegenskaper
- ▶ Bra virusresistens



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: Desmazières

Korsning: FRANCINE x LAURA

Nummersort: DM 99-063-07

Förädlarrätt: 31-12-2041

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: tidig / 7,5

Ljus groddens färg: röd-violett

Blomfärg: ljuslila

Antal bär: ingen / 4

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7

Blast - slutlig utveckling: medel / 7

Blast - rensbarhet: ganska lätt / 7

Blast - styrka: ganska ömtålig / 5,5

Köttfärg: gul / 7

Skalfärg: röd

Skalfinish: utmärkt / 8

Knölstorlek: normal / 6

Knölform: lång

Knölens regelbundenhet: jämn / 7

Knölsättning: hög / 9

Regelbundenhet i storleken: ganska jämn / 6

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Metribuzin: känslig / 5

Bentazon: något känslig / 7

Etylen: - / -

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: känslig / 5

Stöttblått (inre blåmärken): något känslig / 7

Mekaniska skador: något känslig / 7

Undervattenvikt: 391

Torrsubstanshalt: 21,3%

Fördelning av torrsubstans: utmärkt / 8

TGA-nivå: 5,5

Chips kvalitet: olämpligt / 4,5

Friterings kvalitet: olämpligt / 5

Koktyp: fast / A

Missfärgning efter råskalad: känslig / 5,5

Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7


www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 10 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

30/50 mm: 20 cm (67.000 plantor/ha)

Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 4 °C. Lämplig för medel och lång lagring.

Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: något mottaglig* / 6*

Gul nematod Ro 2/3: något mottaglig* / 5*

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: något mottaglig / 7

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Pulverskorv: något mottaglig / 6

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: något mottaglig / 7

Svartpricksjuka: något mottaglig / 7

Rost: mottaglig / 5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något till inte mottaglig / 8

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -

* Resultat markerade med en asterisk (*) är baserade på vår egen forskning och har ännu inte publicerats officiellt.