


Paradiso.

MARKTSEGMENT



Een middenlaat, grofgroeiend knollen met een hoge opbrengst voor de traditionele markten.

- » Grove knollen
- » Mooie presentatie
- » Weinig gevoelig voor stootblauw



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: M. Pot & M. Klaver

Kruising: RODEO x VALOR

Zaailing: PK 06-0108

Kwekersrecht: 31-12-2048

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 5,5

Kiemkleur: rood

Bloemkleur: paars

Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 6,5

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6

Schilkleur: geel

Schilhoedanigheid: goed / 7

Knolgrootte: grof / 8

Knolvorm: ovaal lang

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5

Knolzetting: gemiddeld / 6

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6

Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8

Bentazon: redelijk gevoelig / 6,5

Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

Talent: 5% minder knollen / 4

Doorwas: weinig gevoelig / 7

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5

Rooibeschaadiging: redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht: 329

Drogestofgehalte: 18,2%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: 4,8

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4

Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5

Kooktype: vrij kruimig / B

Rauwverkleuring: - / -

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/paradiso

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 20%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22-24 cm (55.000 planten/ha)

35/55 mm: 32-34 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7,5

Fusarium: vatbaar / 5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -