

Linzer Delikates.

MARKTSEGMENT



Een zeer vroege tafelspecialiteit met uitstekende smaakeigenschappen en een mooie schilhoedanigheid.

- » Vastkokend
- » Hoge knolzetting
- » Goede bewaarbaarheid



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: -
 Kruising: SIEGLINDE x ZAAILING
 Zaailing: SL 76-63
 Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: zeer vroeg / 8
 Kiemkleur: rood paars
 Bloemkleur: wit
 Hoeveelheid bessen: geen / 4
 Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6
 Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
 Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
 Loof - stevigheid plant: vrij slap / 5

Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilkleur: geel
 Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
 Knolgrootte: gemiddeld / 6
 Knolvorm: lang
 Regelmaat knolvorm: vrij onregelmatig / 5
 Knolzetting: hoog / 9
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij lang / 7
 Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: - / -
 Talent: - / -

Doorwas: gevoelig / 5
 Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 340
 Drogestofgehalte: 19,1%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
 Kooktype: vastkokend / A
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/linzer-delikatess

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 20%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

32/40 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: - / -

Fusarium: zeer vatbaar / 4

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: zeer vatbaar / 4

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: weinig vatbaar / 6

Virus - Yn: vatbaar / 5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -