


Gourmandine.

MARKTSEGMENT



Een midden vroeg, tafel- en saladespecialiteit met een mooi gladde schil en een excellente volle smaak.

- » Vastkokend
- » Mooie presentatie
- » Goede bewaarbaarheid



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Bretagne Plants
Kruising: CHARLOTTE x ESTIMA
Zaailing: 92 F 229-11
Kwekersrecht: 31-12-2032

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: paars
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: lang ovaal
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: lang / 8
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groei scheuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 354
Drogestofgehalte: 19,4%
Drogestofverdeling: uitstekend / 8
TGA-gehalte: 5,2

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: vastkokend / A
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/gourmandine

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/40 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

40/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: zeer vatbaar / 4

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: zeer vatbaar / 4

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent* / 10*

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '*' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.