


Picasso.

MARKTSEGMENT



Een laat consumptieras met een gele schil, aansprekende rode ogen, goede schurftresistentie en zeer geschikt voor lange bewaring.

- » Hoge opbrengst
- » Goede droogtetolerantie
- » Weinig gevoelig voor stootblauw en beschadiging



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Duoplant V.O.F.

Kruising: CARA x AUSONIA

Zaailing: HB 81-0036

Kwekersrecht: 31-12-2022

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 5

Kiemkleur: rood paars

Bloemkleur: wit

Hoeveelheid bessen: geen / 4

Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6,5

Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8

Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6

Schilkleur: geel met rode ogen

Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6

Knolgrootte: grof / 8

Knolvorm: ovaal

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6

Knolzetting: gemiddeld / 6

Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: lang / 8

Metribuzin: redelijk gevoelig / 6

Bentazon: - / -

Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6

Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7

Rooibeschaadiging: redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht: 381

Drogestofgehalte: 20,8%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: 1,9

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4

Frietkwaliteit: niet geschikt / 5

Kooktype: vrij kruimig / B

Rauwverkleuring: - / -

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/picasso

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: weinig vatbaar / 7

Poederschurft: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: vatbaar / 5

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 5

Wratziekte F18 (T1): - / -