


Kondor.

MARKTSEGMENT



Een middenlaat, roodschillig consumptieras met een goede hitteresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- » Grove knollen
- » Relatief hoog onderwatergewicht
- » Goede bewaarbaarheid



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.

Kruising: KO 61-0333 x WILJA

Zaailing: KO 67-0593

Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 6

Kiemkleur: rood paars

Bloemkleur: paars

Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6

Schilkleur: rood

Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6

Knolgrootte: grof / 8

Knolvorm: lang ovaal

Regelmaat knolvorm: vrij onregelmatig / 5,5

Knolzetting: vrij laag / 5

Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij lang / 7

Metribuzin: weinig gevoelig / 7

Bentazon: - / -

Ethyleen: - / -

Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas: redelijk gevoelig / 6

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6

Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8

Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 385

Drogestofgehalte: 20,9%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: 3,2

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4

Frietkwaliteit: niet geschikt / 5

Kooktype: vrij kruimig / B

Rauwverkleuring: - / -

Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5


www.agrico.nl/kondor

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Fusarium: weinig vatbaar / 7,5

Erwinia: zeer vatbaar / 3

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F18 (T1): - / -