

Nomade.

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Zetmeel

Een laat zetmeelras met een brede resistentie tegen aardappelmoeheid en een goede opbrengst.

- » Hoge zetmeelopbrengst
- » Relatief vroeg zetmeelras
- » Brede resistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Mts. Boerhave
Kruising: ELLES x AM 78-3704
Zaailing: BH 85-0165
Kwekersrecht: 31-12-2025

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: paars
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Vleeskleur: crème / 5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolgrootte: grof / 8
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: - / -

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 482
Drogestofgehalte: 25,7%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 14,8

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: kruimig / C
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): gevoelig / 5


www.agrico.nl/nomade

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: weinig vatbaar / 6

Aardappelmoeheid Ro 2/3: partieel resistent / 7

Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 8

Aardappelmoeheid Pa 3: resistent / 9

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: - / -

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6,5

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Virus - X: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar / 7

Wratziekte F18 (T1): - / -