

# Severina.

SEGMENTO DE MERCADO



Variedad semitemprana con un buen rendimiento y una bonita piel brillante.

- ▶ **Tubérculos grandes**
- ▶ **Tipo de cocción bastante firme**
- ▶ **Bonita piel**



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtenteor:** Konst Research B.V.  
**Cruzamiento:** AR 00-0093 x MARIANNE  
**Plántula:** KO 08-1715  
**Derechos de obtenteor:** 31-12-2049

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitemprana / 7  
**Color claro del brote:** azul violeta  
**Color de la flor:** blanca  
**Número de bayas:** ninguno / 4  
**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7,5  
**Follaje - desarrollo final:** bastante bueno / 7,5  
**Follaje - selectividad:** media / 6,5  
**Follaje - firmeza:** bastante firme / 7

**Color de la carne:** amarilla clara / 6  
**Color de la piel:** amarilla  
**Finura de la piel:** buena / 7  
**Tamaño de los tubérculos:** grande / 8  
**Forma de los tubérculos:** oval  
**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7  
**Tuberización:** media / 6  
**Regularidad del tamaño:** bastante regular / 6,5

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** bastante corta / 5  
**Metribuzina:** bastante sensible / 6  
**Bentazona:** - / -  
**Etileno:** 5% menos tubérculos / 4

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6,5  
**Grietas de crecimiento:** bastante sensible / 6,5  
**Manchas negras (magulladuras internas):** bastante sensible / 6  
**Daños de recolección:** bastante sensible / 6

**Peso bajo agua:** 326  
**Contenido de materia seca:** 18%  
**Distribución de la materia seca:** - / -  
**Nivel de TGA:** 7,61

**Calidad para chips:** inadecuada / 4  
**Calidad para patatas fritas:** inadecuada / 4  
**Tipo de cocción:** bastante firme / AB  
**Coloración en crudo:** - / -  
**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6



# CÓMO CULTIVAR

[www.agricopotatoes.com/es/severina](http://www.agricopotatoes.com/es/severina)

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar + 25%.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve calentamiento de la semilla. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 25 cm (60.500 plantas/ha)

35/55 mm: 30 cm (54.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje, pero rara vez una reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para la entrega directa desde el campo o el almacenamiento a corto plazo.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** muy sensible / 3,5

**Mildiu del tubérculo:** sensible / 5

**Sarna común:** sensible / 5,5

**Sarna pulverulenta:** ligeramente sensible / 7,5

**Fusarium:** ligeramente sensible / 6,5

**Erwinia:** - / -

**Antracnosis:** ligeramente sensible / 6

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** muy sensible / 4,5

**Virus del enrollado:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** ligeramente a no sensible / 8

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente sensible / 6

**Sarna verrugosa F1:** - / -

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -