2026
2027

Variedades



VARIEDADES
DA VIDA

Say potato,
say Agrico.

AGRICO

VARIEDADES **DA VIDA**

O mundo em que cultivamos e comercializamos batatas está em constante mudança. As alterações climáticas, as novas leis e regulamentos e a crescente necessidade de uma produção alimentar mais sustentável estão a colocar novos desafios a toda a cadeia da batata. Ao mesmo tempo, a necessidade global de quantidades suficientes de alimentos saudáveis e a preços acessíveis continua a crescer.

Para a Agrico, a resposta a estes desenvolvimentos começa com a variedade. Porque na Agrico uma variedade nunca é apenas uma batata. Cada variedade contribui para uma cultura robusta, oferece uma solução adaptada ao mercado e, em última análise, ajuda a garantir a segurança alimentar para uma população mundial em crescimento. É isso que o tema «Variedades da Vida» representa.

Cada mercado, clima ou região de cultivo é único. É por isso que desenvolvemos e fornecemos um vasto portfólio de variedades de batata, cada uma com características adequadas a condições, destinos e necessidades específicas. Esta diversidade permite-nos responder continuamente às necessidades dos produtores, clientes e consumidores, onde quer que se encontrem no mundo.

As variedades naturalmente resistentes constituem uma parte importante do nosso portfólio. Com a iniciativa «Stronger by Nature» (Mais fortes por natureza), focamo-nos em variedades inovadoras que estão naturalmente equipadas para ter um bom desempenho, ajudando a Agrico a enfrentar os desafios atuais e futuros. Baixo consumo de recursos produtivos, elevados resultados. Desta forma, desenvolvemos variedades que contribuem para uma agricultura forte e preparada para o futuro.

As nossas variedades Next Generation são um exemplo claro disso. A sua resistência natural ao míldio ajuda a reduzir a necessidade de produtos fitossanitários durante o cultivo, ao mesmo tempo que proporciona maior segurança tanto para os produtores como para os compradores. Ao mesmo tempo, continuamos a olhar para o futuro, desenvolvendo novas gerações de variedades que estejam ainda melhor preparadas para a evolução das condições.

O tema «Variedades da Vida» vai além da genética e das características dos produtos. Trata-se também do conhecimento que partilhamos, da nossa colaboração com os nossos membros, produtores e parceiros, e da rede internacional em que operamos. Trata-se de variedades que tornam possíveis diferentes possibilidades em diferentes partes do mundo, servindo sempre o mesmo propósito em todo o lado: contribuir para um cultivo de batata preparado para o futuro e para a segurança alimentar das gerações vindouras.

É assim que continuamos, dia após dia, a construir um portfólio de variedades adequadas a diferentes climas, mercados e gerações. Variedades que produzem bons resultados hoje e contribuem para as soluções de amanhã. ■



Mark Zuidhof
Diretor-geral

Índice.










2 Introdução
4 Variedades da Vida
8 Novas variedades 2026
18 Variedades Spotlight
28 As nossas variedades
56 Próximos cloness
62 Variedades com licença
64 Índice
70 Legenda
74 Termos técnicos
79 Outras línguas

Isenção de responsabilidade
A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

VARIEDADES DA VIDA



O mundo é um mundo de diferenças. As nossas variedades têm de se adaptar a essas diferenças. Cada variedade tem um objetivo específico: deve satisfazer as necessidades das pessoas que com ela trabalham, do mercado a que se destina e das condições em que é cultivada. Das utilizações locais ao rendimento, à qualidade e à fiabilidade, cada variedade é desenvolvida para responder a uma necessidade específica.

Porque na Agrico não nos limitamos a desenvolver variedades de batata. Desenvolvemos variedades que demonstram o seu valor onde é mais importante, junto das pessoas que com elas trabalham, nos mercados a que se destinam e nas condições em que são cultivadas.

É isto que o tema «Variedades da Vida» representa

Há mais de 50 anos que olhamos para além da própria batata. Através do melhoramento vegetal e da investigação, procuramos desenvolver variedades que satisfaçam as necessidades de um mundo em constante mudança. Este trabalho resultou num vasto portfólio de variedades desenvolvidas para diversas condições de cultivo, utilizações e necessidades de mercado em todo o mundo.

E não nos limitamos a olhar para o que é necessário hoje. As nossas variedades também têm de estar preparadas para os desafios do futuro. É por isso que continuamos a investir em genética robusta, conhecimento e melhoramento vegetal. A iniciativa «Stronger by Nature» mostra como transformamos essa ambição em realidade: com variedades que são naturalmente resistentes, utilizam os recursos produtivos de forma eficaz e apresentam um desempenho fiável numa vasta gama de condições.

Mas o valor de uma variedade não se cria apenas através do melhoramento vegetal. É também comprovado na prática. É por isso que trabalhamos em conjunto em todo o mundo, partilhando conhecimentos e combinando a experiência local com o know-how internacional. Desta forma, trabalhamos em conjunto para construir cadeias de valor da batata sólidas.

Isto significa que o tema «Variedades da Vida» assume um significado diferente em todo o mundo, mantendo-se sempre enraizado numa ideia comum: desenvolver variedades que acrescentem valor às pessoas, aos mercados e ao mundo de amanhã.

Não nos limitamos a desenvolver variedades de batata.Desenvolvemos variedades para as pessoas, as culturas, os mercados e os climas.

As nossas variedades vão além da própria batata. Juntamente com o nosso conhecimento, experiência e colaboração global, contribuem para a segurança alimentar, uma agricultura preparada para o futuro e cadeias de valor da batata sólidas. É desta forma que o tema «Variedades da Vida» se concretiza na prática.

Agricultura preparada para o futuro

Variedades que respondem à evolução das condições e contribuem para um cultivo de batata robusto, eficiente e sustentável.

Segurança alimentar

Variedades que contribuem para uma produção fiável de batata e ajudam a garantir, no futuro, um abastecimento suficiente de alimentos saudáveis e acessíveis a todos .

Colaboração global

Ao combinar o know-how internacional com o conhecimento e a experiência locais, desenvolvemos variedades adequadas a diferentes mercados, condições de cultivo e utilizações.

Conhecimento e desenvolvimento da cadeia de valor

Partilhar conhecimentos e trabalhar em conjunto ao longo de toda a cadeia de valor ajuda as nossas variedades a demonstrar o seu valor na prática, contribuindo simultaneamente para o fortalecimento das cadeias de valor da batata.

PORQUE NA AGRICO UMA VARIEDADE NUNCA É APENAS UMA BATATA



NOVIDADES!

Novas variedades

É com grande entusiasmo que apresentamos quatro novas e promissoras adições ao nosso portfólio: Feliz (SW 14-7008), Jamaica (AR 14-0334), Texas (AR 14-3488) e Oregon (AR 14-3578).

Após um longo período de ensaios de campo e avaliação, todas as quatro variedades receberam com sucesso a aprovação oficial para comercialização. Com a sua inclusão na Lista de variedades nacionais de 2026, a Feliz, a Jamaica, a Oregon e a Texas estão agora prontas para entrar no mercado com os seus nomes exclusivos.

Feliz
(SW 14-7008).

Retalho
Salada

Variedade de salada, semiprecoce, com tubérculos ovais alongados, grupo culinário A e forte resistência ao PVY.

- **Bom acabamento de pele**
- **Grupo culinário A**
- **Boa resistência ao PVY**



Características Gerais
Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: LORELEY x SW 06-0296
Clone: SW 14-7008
Direito do obtentor: Pendente



Adrie Omtzigt
Gestor de produto

"Descubra a Feliz (SW 14-7008), a batata perfeita para saladas frescas e deliciosas. A Feliz (SW 14-7008) combina um aspeto atraente com um desempenho fiável. Os seus tubérculos de forma longa oval, o bonito acabamento da pele, o excelente sabor e a polpa firme após a cozedura tornam a Feliz (SW 14-7008) uma excelente escolha para os segmentos de produtos frescos e de saladas no retalho. Com o seu elevado número de tubérculos e forte resistência ao vírus PVY, a Feliz também oferece aos produtores uma combinação apelativa de produtividade e fiabilidade. Uma variedade bem equilibrada que reúne uma apresentação atraente, qualidade gustativa e fortes características agronómicas."

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos
Maturação: semiprecoce / 7
Brolho de cor clara: -
Cor da flor: branca
Número de bagas: - / -
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Calibre dos tubérculos: médio / 6,5
Forma dos tubérculos: oval alongada
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: alta / 8
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média a curta / 5,5

Sensibilidade e qualidade
Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeiramente sensível / 7,5
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

COMO CULTIVAR

Fertilização[1]
Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização em três aplicações, fazendo a segunda pouco depois da tuberização.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente
Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação
30/50 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

Ervas daninhas
Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas
É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita
Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento
A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.
[2] Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.

agricopotatoes.pt/feliz

Peso debaixo de água: 358
Teor de matéria seca: 19,6%
Grupo culinário: firme / A
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7
Descoloração em cru: muito sensível / 4
Qualidade para fritura em palitos: - / -
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: -

Resistências
Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

TRV: muito suscetível / 4
Míldio da folha: muito suscetível / 3,5
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: - / -
Sarna comum: suscetível / 5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: - / -

Verruga negra F1: resistente* / 10*
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: suscetível* / 4*
Nemátode dourado Ro 5: suscetível* / 3*
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: moderadamente suscetível* / 5*
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: suscetível* / 3*

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

Say potato, say Agrico.



Jamaica (AR 14-0334).

Tradicional

Retalho
Fresco

Variedade precoce, para o mercado tradicional, com bom calibre e bom acabamento de pele.

- **Boa produtividade**
- **Bom acabamento de pele**
- **Bom calibre**



Características Gerais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: OS 07-0020 x SAVIOLA
Clone: AR 14-0334
Direito do obtentor: Pendente



Adrie Omtzigt
Gestor de produto

"Conheça a Jamaica (AR 14-0334), uma variedade precoce com forte apelo no mercado de produtos frescos. Com o seu bom rendimento, tubérculos de forma longa oval e acabamento atraente da pele, a Jamaica (AR 14-0334) é uma excelente escolha para os segmentos de produtos frescos e de retalho tradicional. A sua forma e calibre regulares contribuem para uma apresentação consistente e atraente, enquanto a sua forte resistência ao vírus PVY proporciona uma vantagem adicional aos produtores. A Jamaica (AR 14-0334) combina um bom rendimento, tubérculos atraentes e um desempenho fiável. Uma variedade promissora com grande potencial no mercado de produtos frescos."

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: precoce / 7,5
Brolho de cor clara: -
Cor da flor: branca
Número de bagas: superior à média / 5
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8
Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5
Firmeza da folhagem: média / 6,5

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Forma dos tubérculos: oval alongada
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: média / 6
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média a curta / 5,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6

Metribuzin[2] pre-emergencia: muito sensível / 3
Metribuzin[2] post-emergencia: muito sensível / 3
Etileno: - / -

COMO CULTIVAR

Fertilização[1]
Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente
Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento.

Distância de plantação
28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (44.500 plantas/ha)

Ervas daninhas
Após a emergência não aplicar metribuzina, pois o seu uso provoca severa reação foliar e grande perda de rendimento.

Fungicidas
É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita
Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento
A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para expedição diretamente do campo ou curto armazenamento.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.
[2] Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.

agricopotatoes.pt/jamaica

Peso debaixo de água: 332
Teor de matéria seca: 18,3%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6
Descoloração em cru: - / -
Qualidade para fritura em palitos: - / -
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: -

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6

TRV: ligeiramente suscetível / 6,5
Míldio da folha: muito suscetível / 3,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6

Fusarium: - / -
Sarna comum: suscetível / 5,5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: - / -

Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: suscetível* / 1*
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode dourado Ro 5: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

Say potato, say Agrico.



Oregon (AR 14-3578).

Indústria
Rodelas

Variedade tardia para batatas fritas ás rodelas, com boa uniformidade dos tubérculos em forma e calibre e bom teor de matéria seca.

- **Forma e calibre regulares**
- **Boa qualidade para batatas fritas às rodelas, mesmo após armazenamento prolongado**
- **Poucos defeitos nos tubérculos**



Características Gerais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LEANDRA x VR 808
Clone: AR 14-3578
Direito do obtentor: Pendente



Adrie Omtzigt
Gestor de produto

"A Oregon (AR 14-3578) é uma variedade fiável para batatas fritas em rodelas de alta qualidade. A uniformidade da forma e do calibre dos tubérculos, o bom teor de matéria seca e a elevada tolerância às manchas negras fazem da Oregon (AR 14-3578) uma escolha sólida para o segmento das batatas fritas em rodelas (chips). A variedade mantém uma boa qualidade de fritura em rodelas mesmo após armazenamento prolongado, proporcionando à indústria uma flexibilidade valiosa ao longo de toda a época. Com a qualidade consistente dos seus tubérculos e sólidas características de processamento, a Oregon (AR 14-3578) reúne uniformidade, capacidade de conservação e desempenho fiável na produção de batatas fritas em rodelas. Qualidade que perdura, com a Oregon (AR 14-3578)."

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 5
Brolho de cor clara: -
Cor da flor: roxa clara
Número de bagas: - / -
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Forma dos tubérculos: oval redonda
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: média / 6
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média / 6,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: sensível / 5

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeiramente sensível / 7
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: - / -

COMO CULTIVAR

Fertilização[1]
Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização em três aplicações, fazendo a segunda pouco depois da tuberização.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente
Preferencialmente, plantar os tubérculos em solo quente, uma vez que o desenvolvimento desta variedade é lento.

Distância de plantação
30/40 mm: 26 cm (51.000 plantas/ha)
40/50 mm: 31 cm (43.000 plantas/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 plantas/ha)

Ervas daninhas
Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas
É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita
Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento
A temperatura preferencial de armazenamento é de 9 °C. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.
[2] Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.

agricopotatoes.pt/oregon

Peso debaixo de água: 465
Teor de matéria seca: 24,9%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Descoloração após cozedura: sensível / 5
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6,5
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Distribuição da matéria seca: bastante baixa / 5,5
Qualidade para fritura em rodelas: excelente / 8
Nível TGA: -

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Vírus - Yntn (tubérculo): - / -

TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: muito suscetível / 4,5
Míldio do tubérculo: suscetível / 5

Fusarium: - / -
Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6,5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: - / -

Verruga negra F1: muito suscetível* / 1*
Verruga negra F6: muito suscetível* / 1*
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode dourado Ro 5: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

Say potato, say Agrico.



Texas (AR 14-3488).

Indústria
Palitos

Variedade tardia, altamente produtiva, para a indústria de batatas fritas aos palitos.

- **Alta produtividade**
- **Alto teor de matéria seca**
- **Resistência múltipla à verruga negra**

NOVAS!



Características Gerais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LEANDRA x AR 07-4113
Clone: AR 14-3488
Direito do obtentor: Pendente



Roeland Jensma
Gestor de produto

"A Texas (AR 14-3488) é uma variedade de elevado rendimento desenvolvida para a indústria de batatas fritas em palitos. Com o seu elevado teor de matéria seca, boa qualidade de fritura em palitos e tubérculos grandes e de forma regular, a Texas (AR 14-3488) oferece características sólidas para processamento. Com resistência a vários tipos de verruga negra, a Texas (AR 14-3488) combina rendimento, adaptabilidade e qualidade de processamento. Uma escolha sólida e versátil para a produção de batatas fritas em palitos."

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 5,5
Brolho de cor clara: -
Cor da flor: branca
Número de bagas: médio / 6
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Forma dos tubérculos: oval alongada
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: média / 6
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: sensível / 5

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeiramente sensível / 7
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: - / -

COMO CULTIVAR

Fertilização[1]
Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente
Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico.

Distância de plantação
28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantas/ha)

Ervas daninhas
Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas
É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita
Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento
Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior a 7 °C. Adequada para períodos longos de armazenamento.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.
[2] Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.

agricopotatoes.pt/texas

Peso debaixo de água: 427
Teor de matéria seca: 23%
Grupo culinário: farinhenta / C
Descoloração após cozedura: sensível / 5,5
Descoloração em cru: muito sensível / 4,5
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Distribuição da matéria seca: média / 6,5
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: -

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6,5
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 6

TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: muito suscetível / 4
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: - / -
Sarna comum: suscetível / 5,5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: - / -

Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: resistente* / 10*
Verruga negra F18: resistente / 10

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode dourado Ro 5: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

Say potato, say Agrico.



Comprovadas em todos os mercados

Todos os anos, destacamos uma seleção de variedades que se destacam. Estas variedades conquistaram o seu lugar graças ao forte desempenho no mercado, à qualidade comprovada e à sua capacidade de satisfazer as necessidades tanto dos produtores como dos clientes.

Com o nosso portfólio amplo e diversificado, há sempre muito por onde escolher. Este ano, destacamos quatro variedades que se destacam verdadeiramente: duas no segmento indústria, uma no segmento tradicional e uma no segmento de retalho. Cada uma tem os seus pontos fortes, desempenho comprovado e uma posição bem estabelecida no mercado.



Feliz
(SW 14-7008).

Retalho
Salada

Variedade de salada, semiprecoce, com tubérculos ovais alongados, grupo culinário A e forte resistência ao PVY.

- **Bom acabamento de pele**
- **Grupo culinário A**
- **Boa resistência ao PVY**



Características Gerais
Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: LORELEY x SW 06-0296
Clone: SW 14-7008
Direito do obtentor: Pendente

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos
Maturação: semiprecoce / 7
Brolho de cor clara: -
Cor da flor: branca
Número de bagas: - / -
Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Calibre dos tubérculos: médio / 6,5
Forma dos tubérculos: oval alongada
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: alta / 8
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média a curta / 5,5

Sensibilidade e qualidade
Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Rachamentos: ligeiramente sensível / 7
Danos mecânicos: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeiramente sensível / 7,5
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

Peso debaixo de água: 358
Teor de matéria seca: 19,6%
Grupo culinário: firme / A
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7
Descoloração em cru: muito sensível / 4
Qualidade para fritura em palitos: - / -
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: -

Resistências
Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 7
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8


TRV: muito suscetível / 4
Míldio da folha: muito suscetível / 3,5
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: - / -
Sarna comum: suscetível / 5
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: - / -

Verruga negra F1: resistente* / 10*
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: suscetível* / 4*
Nemátode dourado Ro 5: suscetível* / 3*
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: moderadamente suscetível* / 5*
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: suscetível* / 3*

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.



COMO CULTIVAR

Fertilização[1]
Azoto: conselho padrão. Dividir a fertilização em três aplicações, fazendo a segunda pouco depois da tuberização.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente
Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação
30/50 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

Ervas daninhas
Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina pode provocar reações na folhagem ou perda de rendimento, mas raramente perda de produção.

Fungicidas
É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita
Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento
A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.
[2] Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.

agricopotatoes.pt/feliz



Adrie Omtzigt
Gestor de produto

“Descubra a Feliz (SW 14-7008), a batata perfeita para saladas frescas e deliciosas. A Feliz (SW 14-7008) combina um aspeto atraente com um desempenho fiável. Os seus tubérculos de forma longa oval, o bonito acabamento da pele, o excelente sabor e a polpa firme após a cozedura tornam a Feliz (SW 14-7008) uma excelente escolha para os segmentos de produtos frescos e de saladas no retalho. Com o seu elevado número de tubérculos e forte resistência ao vírus PVY, a Feliz também oferece aos produtores uma combinação apelativa de produtividade e fiabilidade. Uma variedade bem equilibrada que reúne uma apresentação atraente, qualidade gustativa e fortes características agronómicas..”

Paradiso.

Tradicional

Variedade semitardia, para o mercado tradicional, de tubérculos grandes e excelente rendimento.

- **Tubérculos grandes**
- **Excelente aspeto**
- **Boa tolerância ao calor e à seca**



Características Gerais

Obtentor: M. Pot & M. Klaver
Cruzamento: RODEO x VALOR
Clone: PK 06-0108
Direito do obtentor: 31-12-2048

COMO CULTIVAR

Fertilização[1]

Azoto: conselho padrão - 10%. Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
35/55 mm: 35 cm (38.000 plantas/ha)

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4ºC. Adequada para períodos médios de armazenamento.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.
[2] Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.

agricopotatoes.pt/paradiso

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6
Brolho de cor clara: vermelha
Cor da flor: roxa
Número de bagas: inferior à média / 6,5
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Forma dos tubérculos: oval alongada
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: média / 6
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: ligeiramente sensível / 7
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6,5

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzin[2] post-emergencia: moderadamente sensível / 6,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

Peso debaixo de água: 329
Teor de matéria seca: 18,2%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: - / -
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4,5
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4
Nível TGA: 4,8 mg/100g

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível / 6
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7,5

TRV: muito suscetível / 4
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5

Fusarium: suscetível / 5
Sarna comum: suscetível / 5,5
Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 7,5
Antracnose: suscetível / 5,5

Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode dourado Ro 5: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: - / -

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.





Douwe Werkman
Gestor de produto

"Paradiso, a batata completa! Esta variedade produz rendimentos impressionantes com um elevado número de tubérculos e também se destaca pela sua consistência. Uma planta forte significa que a Paradiso é uma escolha fiável, mesmo em zonas mais quentes. A Paradiso é sinónimo de sucesso anual, de rendimentos consistentes e de batatas bonitas. Junte-se aos clientes satisfeitos e descubra a continuidade e a qualidade que a Paradiso tem para oferecer. Obtenha certezas com a Paradiso!"

Sidney.

Indústria
Palitos

Variedade semitardia, polpa cremosa, para a indústria de batatas fritas aos palitos.

- **Tubérculos grandes**
- **Boa resistência a vírus**
- **Boa distribuição da matéria seca e adequada para QSR.**



Características Gerais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LADY ANNA x AR 05-3392
Clone: AR 12-1680
Direito do obtentor:

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6
Brolho de cor clara: -
Cor da flor: branca
Número de bagas: - / -
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: cremosa / 5
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Forma dos tubérculos: longa oval
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: média / 6
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6,5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: ligeiramente sensível / 7

Metribuzin[2] pre-emergencia: moderadamente sensível / 6,5
Metribuzin[2] post-emergencia: moderadamente sensível / 6,5

Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5


Peso debaixo de água: 396
Teor de matéria seca: 21,5%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7
Descoloração em cru: ligeiramente sensível / 7,5
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Distribuição da matéria seca: excelente / 8,5
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nível TGA: 4,3 mg/100g

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7,5

TRV: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Míldio da folha: /
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6
Sarna comum: suscetível / 5,5
Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 6
Antracnose: suscetível / 5,5



COMO CULTIVAR

Fertilização[1]

Azoto: conselho padrão. De preferência fazer uma dose elevada na primeira cobertura; uma segunda aplicação é opcional.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 26 cm (51.000 plantas/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/55 mm:37 cm (36.000 plantas/ha)
Cut 50/60 mm: 34 cm (39.000 plantas/ha)[3]

Ervas daninhas

Após a emergência não aplicar metribuzina, pois o seu uso provoca severa reação foliar e grande perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior a 7 °C. Adequada para períodos médios de armazenamento.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.
[2] Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.
[3] Nos casos em que o corte da semente é permitido, para a produção de batatas de consumo, o tratamento adequado e medidas rigorosas de higiene são essenciais para minimizar/reduzir os riscos de doença. Qualquer corte e posterior utilização da batata de semente, são realizados por conta e risco do próprio produtor.

agricopotatoes.pt/sidney

Verruga negra F1: muito suscetível* / 1*
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: suscetível / 4
Nemátode dourado Ro 5: suscetível* / 4*
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo / 8
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: moderadamente suscetível / 6

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

Say potato, say Agrico.





Roeland Jensma
Gestor de produto

"Sidney, feita para ser frita! Com os seus tubérculos grandes de forma longa oval, excelente distribuição da matéria seca, polpa de cor creme e qualidade de fritura em palitos acima da média, a Sidney é a escolha perfeita para o segmento de restaurantes de serviço rápido (QSR). Esta variedade semitardia combina características de processamento valiosas com boa resistência a vírus e aos nemátodes do quisto da batateira, oferecendo aos produtores uma cultura fiável e à indústria a qualidade que procura. Aposte na qualidade com a Sidney."

Napoleon.

Indústria
Rodelas

Variedade tardia para fritura em rodelas (chips), com boa uniformidade de calibre e elevado teor de matéria seca.

- **Boa qualidade de fritura em rodelas (chips)**
- **Adequada para a indústria de flocos**
- **Boa resistência a vírus**



Características Gerais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: ANTINA x ALICANTE
Clone: AR 10-4637
Direito do obtentor: 31-12-2051

COMO CULTIVAR

Fertilização[1]
Azoto: conselho padrão - 10%.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão + 20%.

Tratamento da semente
Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação
30/40 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
40/50 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)
50/60 mm: 38 cm (35.000 plantas/ha)

Ervas daninhas
Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas
É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita
Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento
Para fins industriais não armazenar a tempuratura inferior 9 °C. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.
[2] Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.

agricopotatoes.pt/napoleon

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 5
Brolho de cor clara: violeta vermelha
Cor da flor: branca
Número de bagas: muito elevado / 4
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Forma dos tubérculos: redonda oval
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: média / 6
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: sensível / 5,5
Rachamentos: moderadamente sensível / 6
Danos mecânicos: muito sensível / 4,5

Metribuzin[2] pre-emergencia: ligeiramente sensível / 7
Metribuzin[2] post-emergencia: ligeiramente sensível / 7
Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5

Peso debaixo de água: 450
Teor de matéria seca: 24,1%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Distribuição da matéria seca: boa / 7
Qualidade para fritura em rodelas: excelente / 8
Nível TGA: 4,0 mg/100g

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: ligeiramente suscetível / 6
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6,5
Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: ligeiramente suscetível / 6

Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode dourado Ro 5: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: suscetível / 4
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: suscetível / 2

* Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

Say potato, say Agrico.





Adrie Omtzigt
Gestor de produto

"Descubra a Napoleon, a variedade de batata excecional para batatas fritas em rodelas de alta qualidade! Devido à sua excelente qualidade de fritura, distribuição uniforme da matéria seca e pontas açucaradas mínimas, a Napoleon fornece consistentemente um produto final excecional. A variedade produz bons rendimentos e tubérculos de calibre muito uniforme, ideal para o segmento das batatas fritas em rodelas. Com excelente resistência a vírus e adaptabilidade a várias condições de cultivo, a Napoleon é uma variedade muito robusta. Escolher a Napoleon significa escolher qualidade e fiabilidade."

As nossas variedades 2026/2027

Uma visão geral abrangente do nosso portfólio

Este catálogo reúne as principais variedades do nosso vasto e diversificado portfólio, apresentadas por ordem alfabética para facilitar a consulta. Cada variedade é identificada por um ícone com um código de cores, que lhe permite ver, num relance, para que segmento de mercado é mais adequada: tradicional, retalho ou indústria.

Para além das nossas variedades com licença, o catálogo apresenta também uma seleção de variedades sem licença que continuam a ser muito valorizadas e apreciadas pelos nossos clientes.

Biológico

Tradicional

Agrico Originals

Retalho
fresco, babies, saladas, especialidades

Indústria
fécula, rodelas, flocos, palitos, refrigerados

Next Generation
Resistência natural ao míldio



Agata.

Tradicional | Retalho Fresco

Variedade precoce de polpa moderadamente firme quando cozida, com uma pele lisa muito atrente e de alto rendimento.

- **Boa conservação**
- **Boa resistência a vírus**
- **Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos**



Características principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: BM 72-0052 x SIRCO
Maturação: muito precoce / 8
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: excelente / 8
Tuberização: alta / 8
Dormência: curta / 4

Peso debaixo de água: 316
Teor de matéria seca: 17,6%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/agata

Agria.

Biológico | Tradicional | Retalho Fresco | Indústria Palitos, rodelas, 4ª Gama

Variedade tardia para a indústria, de polpa amarela, bom rendimento e de qualidade muito estável.

- **Excelente qualidade de fritura**
- **Múltipla resistência a vírus**
- **Boa conservação**



Características principales

Obtentor: Böhm
Cruzamento: QUARTA x SEMLO
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: longa / 8
Peso debaixo de água: 402
Teor de matéria seca: 21,8%

Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodelas: muito boa / 7,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: ligeiramente suscetível / 9
Verruga negra F6: bastante suscetível / 6

agricopotatoes.pt/agria

Alouette.

Biológico | Tradicional | Retalho Fresco | Indústria 4ª Gama

Variedade de ciclo médio, versátil, de pele vermelha, resistente ao míldio da folha e do tubérculo e adequada para produção convencional e biológica.

- **Boa tolerância a manchas negras**
- **Adequada para cozer e assar no forno**
- **Resistente ao míldio**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 02-139-1 x LAURA
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela / 7,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 389
Teor de matéria seca: 21,1%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente em campo / 8
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/alouette

Arizona.

Tradicional

Variedade semiprecoce de elevado rendimento nas mais variadas condições climáticas.

- **Tubérculos uniformes em calibre e forma**
- **Boa tolerância à seca**
- **Múltipla resistência a vírus**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6

Peso debaixo de água: 301
Teor de matéria seca: 17%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: bastante suscetível / 6


agricopotatoes.pt/arizona

Armedi.

Indústria
Palitos

Variedade para a indústria, semitardia, adequada para a indústria de batatas fritas em palitos.

- **Boa tuberização**
- **Adequada para períodos longos de armazenamento**
- **Múltipla resistência a nemátodes dos quistos da batateira**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: TOPAS x BASIN RUSSET
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6,5
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 402
Teor de matéria seca: 21,8%

Grupo culinário: farinhenta / C
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente em campo / 7
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo / 8
Verruga negra F1: ligeiramente suscetível / 9

agricopotatoes.pt/armedi

Arsenal.

Indústria
Rodelas, flocos

Variedade semitardia, para fritura em rodelas (chips), com elevada resistência aos nemátodes dos quistos da batateira e um bom rendimento.

- **Múltiplas resistências**
- **Adequada para indústria de batatas fritas em rodelas (chips) e flocos**
- **Elevado teor de matéria seca**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 92-1146 x SILVESTER
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 447
Teor de matéria seca: 24%

Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente em campo / 8
Nemátode dourado Ro 5: moderadamente suscetível / 6
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo / 8
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/arsenal

Artemis.

Tradicional
Retalho
Fresco

Variedade semiprecoce, com um excelente rendimento e perfeita para batata frita em uso doméstico.

- **Excelente qualidade de fritura**
- **Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos**
- **Múltiplas resistências**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: RIANTA x RENSKA
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 375

Teor de matéria seca: 20,4%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: média / 6
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/artemis

Babylon.

Tradicional
Retalho
Fresco
Indústria
Palitos, 4ª Gama

Variedade para a indústria, tardia, de polpa amarela, bom rendimento e qualidade muito estável.

- **Excelente qualidade de fritura**
- **Múltipla resistência a vírus**
- **Boa conservação**



Características principales

Obtentor: R.K. Bakker
Cruzamento: AGRIA MUTANT
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6
Dormência: longa / 8
Peso debaixo de água: 401

Teor de matéria seca: 21,7%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente em campo / 8
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/babylon

Beyonce.

Biológico | Indústria
Rodelas, flocos

Variedade de ciclo médio para fritura em rodelas (chips), com um bom teor de matéria seca, adequada para armazenamento de médio prazo e resistente ao míldio da folha e do tubérculo.

- **Tubérculos grandes**
- **Teor inicial de matéria seca**
- **Excelente qualidade dos chips**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 94-2061 x LADY JO
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Tuberização: média / 6
Dormência: média a longa / 7
Peso debaixo de água: 446
Teor de matéria seca: 23,9%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em rodelas: excelente / 8
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5

agricopotatoes.pt/beyonce

Carolus.

Biológico | Tradicional | Retalho
Fresco

Variedade semitardia, multiusos, com olhos vermelhos atrativos e resistente ao míldio da folha e do tubérculo.

- **Variedade multiusos**
- **Elevado teor de matéria seca**
- **Polpa farinhenta**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AGRIA x AR 00-94-17
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 398
Teor de matéria seca: 21,6%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/carolus

Chester (AR 13-2694).

Indústria
Rodelas, flocos

Variedade semiprecoce para a indústria de chips, resistente à G. Pallida, uniforme em calibre, bom teor de matéria seca e boa tolerância ao azulamento.

- **Alto rendimento e boa tuberização**
- **Boa qualidade de fritura mesmo após longo período de armazenamento**
- **Teor inicial de matéria seca**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 07-4052 x ALICANTE
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Tuberização: média / 6,5
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 446
Teor de matéria seca: 24%
Grupo culinário: farinhenta / C
Qualidade para fritura em rodelas: excelente / 8
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo / 8
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo / 8
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/chester

Constance.

Tradicional | Retalho
Fresco

Variedade semiprecoce, com pele amarela brilhante e polpa amarela clara.

- **Excelente aspeto**
- **Tubérculos de calibre uniforme**
- **Polpa bastante firme após cozedura**



Características principales

Obtentor: J.L. Spijkman
Cruzamento: MARABEL x AR 93-1243
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: excelente / 8
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 358
Teor de matéria seca: 19,7%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB

agricopotatoes.pt/constance

Corazon.

Tradicional

Retalho
Fresco

Variedade semiprecoce de pele vermelha e bom rendimento precoce.

- **Excelente qualidade da pele**
- **Polpa bastante firme após cozedura**
- **Boa tuberização**



Características principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: EVOLUTION x MANITOU
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 321

Teor de matéria seca: 17,8%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 5: resistente em campo / 8
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9

agricopotatoes.pt/corazon

Diamant.

Tradicional

Variedade semitardia, versátil, com boa tolerância ao calor, elevado rendimento e adequada para batata frita em uso doméstico.

- **Excelente qualidade de fritura**
- **Boa resistência a vírus**
- **Adequada para segunda cultura**



Características principales

Obtentor: Precardi
Cruzamento: CARDINAL MUTANT
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 420

Teor de matéria seca: 23%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível / 6
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: bastante suscetível / 6

agricopotatoes.pt/diamant

Erika.

Retalho
Fresco, salada

Variedade precoce de polpa firme, para os segmentos de retalho e salada, com boa resistência à sarna comum.

- **Excelente aspeto**
- **Tuberização elevada**
- **Boa resistência ao vírus Y**



Características principales

Obtentor: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Cruzamento: MARABEL x AR 88-0156
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: excelente / 8

Tuberização: média alta / 7
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 337
Teor de matéria seca: 18,6%
Grupo culinário: firme / A
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

agricopotatoes.pt/erika

Esmee.

Tradicional

Retalho
Fresco

Variedade semiprecoce, com uma bonita pele vermelha, boa tolerância ao calor e bom rendimento.

- **Excelente aspeto**
- **Tubérculos grandes**
- **Múltipla resistência a vírus**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LAURA x RODEO
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: excelente / 8
Tuberização: média / 6

Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 326
Teor de matéria seca: 18%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: resistente / 10


agricopotatoes.pt/esmee

Evolution.

Tradicional

Variedade semiprecoce, com uma atrativa pele vermelha escura e um bom rendimento precoce.

- **Tubérculos grandes**
- **Boa tolerância à secura**
- **Múltipla resistência aos nemátodes dos quistos da batateira**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 94-0807 x AMOROSA
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: curta / 4
Peso debaixo de água: 343

Teor de matéria seca: 18,9%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: moderadamente suscetível / 6
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo / 7
Verruga negra F1: moderadamente suscetível / 8
Verruga negra F6: resistente / 10

agricopotatoes.pt/evolution

Fajah.

Tradicional

Variedade precoce, forte, com tubérculos grandes, regulares em forma e teor de matéria seca relativamente elevado.

- **Tubérculos grandes e elevado rendimento**
- **Tubérculos ovais alongados e calibre uniforme**
- **Dormência curta, adequada para uma segunda cultura**



Características principales

Obtentor: R. Rispens
Cruzamento: LANORMA x AMBITION
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: média / 6

Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 354
Teor de matéria seca: 19,4%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

agricopotatoes.pt/fajah

Feliz (SW 14-7008).

Retail
Salada

Excelente aspeto, excelente desempenho!

O poder da inovação

Variedade de salada, semiprecoce, com tubérculos ovais alongados, grupo culinário A e forte resistência ao PVY.



- **Bom acabamento de pele**
- **Grupo culinário A**
- **Boa resistência ao PVY**

Todas as informações e dados técnicos da variedade spotlight podem ser encontrados na ***página 10 & 20*** *ou digitalizar o código QR.*

agricopotatoes.pt/feliz

Fontane.

Indústria
Palitos, rodelas, flocos

Variedade de indústria, semitardia, de elevado rendimento, para a produção de flocos e batatas fritas em palitos.

- **Tubérculos grandes**
- **Elevado teor de matéria seca**
- **Adequada para diferentes tipos de solo**



Características principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: AGRIA x AR 76-034-03
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5,5
Teor de matéria seca: 23,2%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5
Verruga negra F1: bastante suscetível / 6
Verruga negra F6: moderadamente suscetível / 8

agricopotatoes.pt/fontane

Jacky.

Biológico | **Retalho** Babies | **Indústria** 4ª Gama

Variedade semiprecoce de pequeno calibre (babies), elevado rendimento e resistência ao míldio da folha e do tubérculo.

- **Polpa moderadamente farinhenta**
- **Tuberização elevada**
- **Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos**



Características principales

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: ANOUK x ATHLETE
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: alta / 9
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 368
Teor de matéria seca: 20,1%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9


agricopotatoes.pt/jacky

Jolene.

Tradicional | **Retalho** Fresco

Variedade de ciclo médio com um bom acabamento de pele e boa conservação.

- **Adequada para batata frita em uso doméstico**
- **Tubérculos uniforme em forma**
- **Bom teor de matéria seca**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: SAGITTA x AR 03-1491
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 389
Teor de matéria seca: 21,1%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7


agricopotatoes.pt/jolene

Kuroda.

Tradicional

Variedade semitardia de pele vermelha, com excelente tolerância ao calor e muito bom rendimento.

- **Tubérculos grandes**
- **Boa conservação**
- **Múltiplas resistências à verruga negra**



Características principales

Obtentor: G. Kuik
Cruzamento: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: longa / 8
Peso debaixo de água: 426
Teor de matéria seca: 23%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9

agricopotatoes.pt/kuroda

Leonore.

Tradicional | Indústria Palitos

Variedade para a indústria, precoce, de boa produção.

- **Boa qualidade da pele**
- **Boa resistência a vírus**
- **Tubérculos longo ovais**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: EXCELLENCY x AR 06-3754
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6,5
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 397
Teor de matéria seca: 21,5%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/leonore

Levante.

Biológico | Tradicional | Retalho Fresco

Variedade semitardia de elevado rendimento, com uma bonita pele amarela, resistente ao míldio da folha e do tubérculo.

- **Tuberização elevada**
- **Bom acabamento de pele**
- **Boa conservação**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 01-3218 x ALMERA
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: alta / 8
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 365
Teor de matéria seca: 19,9%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5

agricopotatoes.pt/levante

Lugano.

Tradicional | Indústria Palitos

Variedade de indústria, semitardia, de polpa amarela e boa resistência aos nematodes dos quistos da batateira e verruga negra.

- **Tubérculos grandes**
- **Múltiplas resistências**
- **Boa conservação**



Características principales

Obtentor: F.J. Vos
Cruzamento: AR 00-2211 x AR 99-0669
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: longa / 8
Peso debaixo de água: 394
Teor de matéria seca: 21,4%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 5: resistente / 9
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente / 9
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9


agricopotatoes.pt/lugano

Manitou.

Tradicional | Retalho Fresco

Variedade tardia, de pele vermelha e elevado rendimento.

- **Tubérculos grandes**
- **Boa tolerância à secura**
- **Tubérculos de calibre uniforme**



Características principales

Obtentor: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Cruzamento: LAURA x MARANCA
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 351
Teor de matéria seca: 19,4%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 5: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10


agricopotatoes.pt/manitou

Markies.

Tradicional **Indústria** Palitos, rodelas

Variedade tardia de elevado rendimento, adequada para o mercado de processamento.

- **Excelente qualidade de fritura**
- **Bom teor de matéria seca**
- **Adequada para períodos longos de armazenamento**



Características principales

Obtentor: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Cruzamento: FIANNA x AGRIA
Maturação: tardia / 4
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6,5

Peso debaixo de água: 427
Teor de matéria seca: 22,8%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodelas: muito boa / 7,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível / 6,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7

agricopotatoes.pt/markies

Melrose.

Retalho Fresco, especialidades **Indústria** 4ª Gama

Variedade multiusos, semitardia, com um sabor intenso.

- **Polpa bastante farinhenta após cozedura**
- **Polpa amarela**
- **Pele vermelha clara**




Características principales

Obtentor: C.R.A.
Cruzamento: BP 15.7.70 x AM 15.1.68
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: alta / 8

Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 406
Teor de matéria seca: 22%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Verruga negra F1: moderadamente suscetível / 7

agricopotatoes.pt/melrose



Meryem.

Tradicional

Variedade tardia, de elevado rendimento com uma bonita pele vermelha.

- **Boa tolerância à secura**
- **Boa tuberização**
- **Boa resistência a vírus**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LUSA x AR 01-0420
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: muito boa / 7,5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: curta / 4

Peso debaixo de água: 349
Teor de matéria seca: 19,2%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9

agricopotatoes.pt/meryem

Picasso.

Tradicional

Variedade tardia de pele amarela, com olhos vermelhos proeminentes, boa resistência à sarna comum e aptidão para longos períodos de armazenamento.

- **Elevado rendimento**
- **Boa tolerância à secura**
- **Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos.**



Características principales

Obtentor: Duoplant V.O.F.
Cruzamento: CARA x AUSONIA
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6
Dormência: longa / 8

Peso debaixo de água: 381
Teor de matéria seca: 20,8%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/picasso

Paradiso.

Tradicional

A batata completa: forte, fabulosa e com rendimentos impressionantes!

O poder da inovação

Variedade semitardia, para o mercado tradicional, de tubérculos grandes e excelente rendimento.



- **Tubérculos grandes**
- **Excelente aspeto**
- **Boa tolerância ao calor e à seca**

Todas as informações e dados técnicos da variedade spotlight podem ser encontrados na ***página 22*** *ou digitalizar o código QR.*

agricopotatoes.pt/paradiso

Premiere.

Indústria
Palitos

Variedade muito precoce para a indústria de batatas fritas em palitos, com um bom rendimento precoce.

- **Expedição diretamente do campo**
- **Elevado teor de matéria seca**
- **Boa distribuição da matéria seca**



Características principales

Obtentor: Precardi
Cruzamento: CIVA x PROVITA
Maturação: muito precoce / 8
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 416

Teor de matéria seca: 22,4%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/premiere

Ranomi.

Tradicional

Retalho
Fresco

Variedade precoce com resistência relativamente boa à sarna comum e bom rendimento.

- **Bonito acabamento de pele**
- **Tubérculos grandes**
- **Polpa bastante firme após cozedura**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 322

Teor de matéria seca: 17,9%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/ranomi

Riviera.

Tradicional

Variedade muito precoce de pele atrativa, excelente tolerância ao calor, boa resistência a vírus e bom rendimento.

- **Tubérculos grandes**
- **Excelente aspeto**
- **Boa resistência a vírus**



Características principales

Obtentor: Mts. Boerhave
Cruzamento: MINERVA x ALCMARIA
Maturação: muito precoce / 8
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: excelente / 8
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 318

Teor de matéria seca: 17,7%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Verruga negra F1: resistente / 10


agricopotatoes.pt/riviera

Rudolph.

Tradicional

Variedade semitardia, de pele vermelha muito atrativa, boa tolerância ao calor e rendimento muito elevado.

- **Polpa branca**
- **Tubérculos grandes**
- **Boa conservação**



Características principales

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: CHIEFTAIN x STIRLING
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: branca / 4
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: média a longa / 7
Peso debaixo de água: 376

Teor de matéria seca: 20,5%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: moderadamente suscetível / 8

agricopotatoes.pt/rudolph

Sevas
(KO 13-2242).

Tradicional

Variedade semitardia de grandes tubérculos ovais, boa dormência e boa tolerância ao azulamento.

- **Alto rendimento**
- **Boa resistência aos vírus e sarna**
- **Bonito acabamento de pele**



Características principales

Obtentor: Konst Research B.V.
Cruzamento: KO 06-1457 x SAVANNA
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: baixa a média / 5,5
Dormência: média a longa / 7,5

Peso debaixo de água: 350
Teor de matéria seca: 19,2%
Grupo culinário: firme / A
Qualidade para fritura em palitos: média / 6
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/sevas

Sevilla.

Biológico | Indústria
Palitos, rodelas

Variedade tardia com bom peso dentro de água, muito saborosa e resistente ao míldio da folha.

- **Resistente ao míldio**
- **Baixa necessidade em azoto**
- **Boa tolerância à secura**




Características principales

Obtentor: N. Vos
Cruzamento: AGRIA x DOB 1997-507-015
Maturação: tardia / 4,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Tuberização: média alta / 7

Dormência: longa / 8
Peso debaixo de água: 385
Teor de matéria seca: 21%
Grupo culinário: farinhenta / C
Qualidade para fritura em palitos: muito boa / 7,5
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

agricopotatoes.pt/sevilla



Sinora.

Indústria
Palitos, rodelas

Variedade semiprecoce, de elevado rendimento, fácil de cultivar, para cultura precoce de batata para fritura em palitos (french fries) ou rodelas (chips).

- **Expedir diretamente do campo**
- **Elevado teor de matéria seca**
- **Boa resistência a vírus**



Características principales

Obtentor: J. Schilt
Cruzamento: AGRIA x AM 70-2166
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média / 6

Peso debaixo de água: 416
Teor de matéria seca: 22,6%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodelas: excelente / 8
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

agricopotatoes.pt/sinora

Spunta.

Tradicional

Variedade de ciclo médio com uma boa tolerância ao calor e elevado rendimento.

- **Tubérculos grandes**
- **Tubérculos de calibre uniforme**
- **Elevado teor de matéria seca**



Características principales

Obtentor: J. Oldenburger
Cruzamento: BEA x USDA 96-56
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6

Peso debaixo de água: 387
Teor de matéria seca: 21%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: média / 6
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/spunta

Twinner.

Biológico | Tradicional | Retalho Fresco

Variedade precoce, resistente ao míldio da folha e do tubérculo, para cultivo convencional e biológico.

- **Tubérculos grandes**
- **Excelente aspeto**
- **Polpa bastante firme após cozedura**



Características principales

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamento: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 359

Teor de matéria seca: 19,7%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: resistente / 10

agricopotatoes.pt/twinner

Twister.

Biológico | Tradicional | Retalho Fresco

Variedade semiprecoce, resistente ao míldio da folha e do tubérculo, bom rendimento, para produção convencional e biológica.

- **Excelente aspeto**
- **Boa conservação**
- **Polpa bastante firme após cozedura**



Características principales

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamento: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6,5
Dormência: média a longa / 7
Peso debaixo de água: 345

Teor de matéria seca: 19%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: moderadamente suscetível / 8

agricopotatoes.pt/twister

Vogue.

Tradicional

Variedade semiprecoce, com tubérculos de calibre grande e uniforme.

- **Polpa bastante firme após cozedura**
- **Tubérculos grandes**
- **Tuberização precoce**



Características principais

Obtentor: Konst Research B.V.
Cruzamento: MARABEL x AMOROSA
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: baixa a média / 5,5
Dormência: média a curta / 5

Peso debaixo de água: 311
Teor de matéria seca: 17,3%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nématode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: ligeiramente suscetível / 9

agricopotatoes.pt/vogue

Notes.

Um vislumbre do futuro do cultivo da batata

Estamos entusiasmados por oferecer um primeiro vislumbre de uma nova geração de variedades de batata promissoras. Atualmente na fase final de teste, estas variedades ainda não estão disponíveis para venda, mas já demonstram um grande potencial para o futuro.

Considere isto como uma antevisão exclusiva do que se segue no cultivo da batata: variedades promissoras que poderão em breve deixar a sua marca no mercado.

AR 16-0165.

Biológico | Tradicional

Variedade semitardia, de pele muito atrativa, boa tolerância ao calor, ampla resistência aos nemátodos do quisto da batata e elevado rendimento

- **Tubérculos grandes, uniformes e ovais**
- **Após cozedura obtemos uma textura mais farinhenta, ideal para fritar em uso doméstico**
- **Uma planta robusta, com um bom sistema radicular e elevada resistência ao PVY**



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 07-3009 x AR 08-3398
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: - / -
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 367
Teor de matéria seca: 20,1%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente* / 9*
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente* / 9*
Nemátode dourado Ro 5: resistente* / 9*
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente* / 9*
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente* / 9*


Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

AR 16-1404.

Biológico | Tradicional | Indústria Palitos

Variedade semiprecoce, para a indústria, de boa tuberização precoce com forma e calibre regulares.

- **Boa tolerância ao míldio da folha**
- **Resistente ao vírus Y**
- **Bom número de tubérculos**



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 10-4512 x JOLENE
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: - / -
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 388
Teor de matéria seca: 21,1%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: ligeiramente suscetível / 9

CR 13-3717.

Biológico | Indústria Palitos

Variedade semitardia, com tubérculos grandes, adequada para o mercado de processamento.

- **Variedade de Next Generation+**
- **Alta produtividade**
- **Boa tolerância à sarna**



Características principais

Obtentor: Mts. Crijns-Hop
Cruzamento: AR 07-3626 x AR 05-3409
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Tuberização: - / -
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 377
Teor de matéria seca: 20,5%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5

⊕ *As variedades marcadas com este símbolo são variedades de Nova Geração com genes de resistência empilhados.*

PL 17-0210.

Biológico | Indústria Fécula

Variedade para fécula com resistência múltipla aos nemátodos e resistente ao míldio da folha e do tubérculo.

- **Boa produtividade**
- **Alto teor de matéria seca**
- **Resistente ao míldio**



Características principais

Obtentor: AKV Langholt
Cruzamento: AVENANCE x PL 08-4010
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: fraca / 4,5
Tuberização: média / 6,5
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 517
Teor de matéria seca: 27,4%
Grupo culinário: farinhenta / CD
Qualidade para fritura em rodelas: superior à média / 6,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: moderadamente suscetível / 6

SW 15-6459.

Indústria
4ª Gama

Variedade de retalho, semiprecoce, com tubérculos ovais e bom acabamento de pele.

- **Adequado para a indústria de descasque**
- **Elevado número de tubérculos por planta**
- **Polpa moderadamente firme após cozedura**



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: REGINA x SA 06-0104
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Tuberização: - / -
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 389

Teor de matéria seca: 21,1%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Qualidade para fritura em rodelas: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente em campo / 7
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente em campo / 7
Nemátode dourado Ro 5: moderadamente suscetível / 6
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5
Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

SW 16-8008.

Biológico | Retalho
Fresco

Uma variedade de resistente pele amarela, para o consumo em fresco, de alto rendimento e ciclo Semiprecoce, com resistência ao míldio, ideal para uma vasta gama de produtos frescos

- **Elevado potencial de produtividade com um desempenho forte e consistente**
- **Acabamento de pele atraente, com boa quantidade de tubérculos de tamanho uniforme**
- **Variedade de nova geração com um bom conjunto de resistências**



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: AR 09-5135 x AR 08-3159
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: - / -
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 344

Teor de matéria seca: 18,9%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: suscetível / 5
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente* / 9*
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo* / 7*
Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

TW 17-1410.

Biológico | Retalho
Fresco

Variedade de ciclo médio, de pele vermelha, resistente ao míldio da folha e do tubérculo e adequada para produção convencional e biológica.

- **Alta produtividade**
- **Boa resistência a vírus**
- **Bonita cor de pele**



Características principais

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamento: ALOUETTE x AR 09-4077
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: - / -
Dormência: média a curta / 5

Peso debaixo de água: 369
Teor de matéria seca: 19,9%
Grupo culinário: firme / A
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: resistente / 10

As variedades marcadas com este símbolo são variedades de Nova Geração com genes de resistência empilhados.

TW 18-1401.

Biológico | Retalho
Especialidades

Uma variedade precoce para consumo em fresco, com resistência natural ao míldio da folha e dos tubérculos, adequada para a produção em modo convencional e biológico

- **Polpa firme**
- **Variedade Precoce**
- **Variedade de nova geração com boa resistência a vírus**



Características principais

Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamento: LORELEY x LM 11-0212
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: - / -
Dormência: curta / 4,5

Peso debaixo de água: 350
Teor de matéria seca: 19,5%
Grupo culinário: firme / A
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente em campo* / 8*
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.
As variedades marcadas com este símbolo são variedades de Nova Geração com genes de resistência empilhados.

Partilhando a genética e a experiência wem todo o mundo

A Agrico não se limita a exportar batatas de semente de alta qualidade dos Países Baixos. A nossa genética, conhecimento e experiência chegam a mercados em todo o mundo.

Através das nossas variedades com licença exclusivas*, ajudamos os clientes a desenvolver e a fortalecer os seus mercados locais com variedades distintas e de elevado valor acrescentado. Partindo da cultura de tecidos in vitro, proporcionamos acesso à genética robusta da Agrico e apoiamos o percurso dos clientes, desde a propagação até ao mercado.

É com orgulho que apresentamos uma seleção das nossas melhores variedades com licença, desenvolvidas para criar valor e causar impacto nos mercados de todo o mundo.

** Nos Países Baixos, estas variedades não são cultivadas como batatas de semente.*





Nome	Página	Segmento de mercado				Rótulos	Características								Resistências						
								Maturação	Cor da pele	Cor da polpa	Formados	Teor de matéria seca	Grupo culinário	Qualidade para fritura em rodelas	Qualidade para fritura em palitos	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Míldio da folha	Míldio do tubérculo
Agata	30		✓	Fresco				8	Y	6	O	17,6	AB	4	4	9	-	-	-	-	5	6
Agria	30	✓	✓	Fresco	Palitos, Rodelas, 4ª Gama		✓	5	Y	7	OL	21,8	BC	7,5	8	9	-	-	2	2	5,5	7
Alouette	31	✓	✓	Fresco	4ª Gama	✓		6	R	7,5	OL	21,1	AB	-	6,5	9	8	4	-	-	9	9
AR 16-1404	58	✓	✓		Palitos	✓		6,5	Y	7	O	21,1	AB	-	8	9	-	-	-	-	9	-
AR 16-0165	58	✓	✓			✓		5	Y	6	O	20,1	BC	-	-	9*	9*	9*	9*	9*	9	6
Arizona	31		✓					7	Y	6	O	17	AB	4	4	9	-	-	-	-	4	5
Armedi	32				Palitos			5,5	Y	6	OL	21,8	C	7	8	9	7	5	9	8	4	7,5
Arsenal	32				Rodelas, Flocos			5,5	Y	6	RO	24	BC	7	7,5	9	8	6	9	8	4,5	5,5
Artemis	33		✓	Fresco				7	Y	6	OL	20,4	B	6	6	9	-	-	-	-	5	8
Babylon	33		✓	Fresco	Palitos, Rodelas, 4ª Gama			5	Y	7	OL	21,7	BC	7	8	8	-	-	-	-	5,5	6,5
Beyonce	34	✓			Rodelas, Flocos	✓		6	Y	6,5	OR	23,9	BC	8	7	4	-	-	-	-	8,5	7,5
Carolus	34	✓	✓	Fresco		✓		6	Y/R	7	O	21,6	BC	7	7	-	-	-	-	-	9	9
Cerisa				Salada				7,5	R	7	L	21,3	A	4,5	5	-	-	-	-	-	4	7
Chester (AR 13-2694)	35				Rodelas, Flocos			6	Y	6,5	OR	24	C	8	-	4*	2*	-	8*	7*	5	5
Constance	35		✓	Fresco				7	Y	6,5	OR	19,7	AB	4	5,5	-	-	-	-	-	5	4,5
Corazon	36		✓	Fresco				7	R	6	OL	17,8	AB	4	5,5	9	9	8	-	-	4,5	6,5
CR 13-3717	59					✓+												-				
Diamant	36		✓					6	Y	6	O	23	B	6	7	9	-	-	-	-	6	7
Erika	37			Fresco, Salada				7,5	Y	6	LO	18,6	A	4	5	9	-	-	-	-	3,5	4
Esmee	37		✓	Fresco				6,5	R	7	OL	18	AB	4	6	-	-	-	-	-	4,5	7
Evolution	38		✓					6,5	R	6	OL	18,9	B	4	4,5	9	6	-	7	5	4	6

Nome	Página	Segmento de mercado			Rótulos	Características								Resistências						
							Maturação	Cor da pele	Cor da polpa	Formados	Teor de matéria seca	Grupo culinário	Qualidade para fritura em rodelas	Qualidade para fritura em palitos	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Míldio da folha	Míldio do tubérculo
Fajah	38		✓				5,5	Y	6	LO	19,4	BC	6,5	7	9	-	-	3	2	4	5,5
Feliz (SW 14-7008)	10, 20, 39			Salada			7	Y	6,5	OL	19,6	A	-	-	9*	-	3*	6*	3*	3,5	5,5
Fontane	40				Palitos, Rodelas, Flocos		✓ 5,5	Y	6,5	O	23,2	BC	7	7,5	9	-	-	-	-	5	6,5
Jacky	40	✓		Babies	4ª Gama	✓		6,5	Y	6,5	RO	20,1	B	5	5,5	9	-	-	-	-	9	9
Jamaica (AR 14-0334)	12		✓					7,5	Y	6,5	OL	18,3	AB	-	-	1*	-	-	-	-	3,5	6
Jolene	41		✓	Fresco				6	Y	6	OL	21,1	B	5	7	-	-	-	-	-	4	5
Kuroda	41		✓					6	R	6	O	23	BC	5	5,5	9	-	-	-	-	5	5
Leonore	42				Palitos			7,5	Y	7	LO	21,5	BC	-	7	9*	-	-	-	-	3,5	5
Levante	42	✓	✓	Fresco		✓		5,5	Y	6	LO	19,9	B	4,5	5,5	9	-	-	-	-	8,5	7,5
Lugano	43		✓		Palitos			5,5	Y	6,5	OL	21,4	B	5,5	7	9	9	9	9	9	5	5,5
Manitou	43		✓	Fresco				5	R	6	LO	19,4	B	4,5	5,5	9	9	9	-	-	5	6
Markies	44		✓		Palitos, Rodelas		✓	4	Y	6,5	OL	22,8	BC	7,5	8	9	-	-	-	-	6,5	7
Melrose	44			Fresco,	4ª Gama			6	R	7	O	22	B	5	6,5	-	-	-	-	-	4	-
Meryem	46		✓					5	R	6,5	LO	19,2	B	4	5,5	-	-	-	-	-	4,5	6
Napoleon	26, 45				Rodelas Flocos			5	Y	6,5	RO	24,1	BC	8	7	9	-	-	4	2	6	6,5
Oregon (AR 14-3578)	14				Rodelas			5	Y	6	OR	24,9	BC	8	6,5	9*	-	-	-	-	4,5	5
Paradiso	22, 47		✓					5,5	Y	6	OL	18,2	B	4	4,5	9	-	-	-	-	5,5	6,5
Picasso	46		✓					5	Y/R	6	O	20,8	B	4	5	9	-	-	-	-	5	7
PL 17-0210	59	✓			Fécula	✓		5	Y	6	RO	27,4	CD	6,5	-	9	9	4	5	6	9	8
Premiere	48				Palitos			8	Y	6	OR	22,4	BC	5	6,5	9	-	-	-	-	4	6
Ranomi	48		✓	Fresco				7,5	Y	6,5	OL	17,9	AB	5	6,5	9	-	-	-	-	4	6
Riviera	49		✓					8	Y	6	OR	17,7	AB	4	4,5	9	-	-	-	-	3	5
Rudolph	49		✓					5,5	R	4	OR	20,5	AB	5,5	6,5	-	-	-	-	-	5,5	5,5

Nome	Página	Segmento de mercado			Rótulos	Características								Resistências						
							Maturação	Cor da pele	Cor da polpa	Formados	Teor de matéria seca	Grupo culinário	Qualidade para fritura em rodelas	Qualidade para fritura em palitos	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Míldio da folha	Míldio do tubérculo
Sevas	50		✓				5,5	Y	6	O	19,2	A	-	6	9*	-	-	-	-	5,5	6
Sevilla	50	✓			Palitos, Rodelas		4,5	Y	7	O	21	C	7	7,5	-	-	-	-	-	9	-
Sidney	24, 51				Palitos		6	Y	4,5	LO	21,5	B	-	6,5	9	4	4*	8	6	4	8
Sinora	52				Palitos, Rodelas	✓	7	Y	6,5	OR	22,6	B	8	7,5	9	-	-	4	2	4,5	5
Spunta	52		✓				6	Y	6	L	21	BC	5,5	6	-	-	-	2	2	5,5	5
SW 15-6459	60				4ª Gama		6	Y	7	RO	21,10%	AB	-	-	7	7	6	-	-	3	7,5
SW 16-8008	60	✓		Fresco		✓	6	Y	6	OL	18,9	B	-	-	4*	-	-	9*	7*	9	5
Texas (AR 14-3488)	16				Palitos		5,5	Y	6	OL	23	C	-	7	6*	-	-	-	-	4	5,5
TW 17-1410	61					✓+															
TW 18-1401	61	✓		Special		✓+	7,5	Y	6,5	LO	19,5	A	4	-	8*	-	-	-	-	9	6
Twinner	53	✓	✓	Fresco		✓	7,5	Y	7	O	19,7	AB	5	6,5	9	-	-	-	-	8	9
Twister	53	✓	✓	Fresco		✓	7	Y	6,5	RO	19	AB	4	5	9	-	-	-	-	9	9
Vogue	54		✓				6,5	Y	7	OL	17,3	AB	4	5	9	-	-	-	-	4	6

** Itens assinalados com asterisco (*) baseiam-se na nossa própria investigação e não foram ainda oficialmente publicados.* ■

Segmento de mercado

Tradicional

Retalho
- Fresco, Babies, Salada, Especialidades

Indústria
- Palitos, Rodelas, Flocos, Fécula, 4ª Gama

Método de cultivo

Biológico (Adequada para cultura em modo de produção biológico)

Variedades para Next Generation

As variedades marcadas com o símbolo Next Generation têm uma resistência natural à requeima.

As variedades marcadas com este símbolo são variedades Next Generation com genes de resistência empilhados.

Agrico Originals

As variedades, marcadas com o símbolo Agrico Originals, têm desempenhado um papel fundamental no cultivo global da batata e realmente fizeram a diferença.

Características da planta e dos tubérculos
Plant and tuber characteristics

Maturação	4 tardia; 4,5 tardia; 5 tardia; 5,5 semitardia; 6 semitardia; 6,5 semiprecoce; 7 semiprecoce; 7,5 precoce; 8 muito precoce; 8,5 muito precoce; 9 muito precoce
Brolho de cor clara	Violeta Vermelha Vermelha Violeta Azul Violeta Voleta Verde Verde Violeta Vermelha Verde Vermelha Verde Violeta Azul Vermelha
Cor da flor	**B** branca **RC** roxa clara **R** roxa **AC** azul clara **A** azul **V** violeta **RE** roxa escura **RA** roxa azulada
Número de bagas	4 muito elevado; 4,5 elevado; 5 superior à média; 5,5 superior à média; 6 médio; 6,5 inferior à média; 7 inferior à média; 7,5 baixo; 8 nenhuma
Folhagem - desenvolvimento inicial	4 lento; 4,5 lento; 5 bastante lento; 5,5 bastante lento; 6 médio; 6,5 médio; 7 bastante rápido; 7,5 bastante rápido; 8 rápido
Folhagem - desenvolvimento final	4 fraco; 4,5 fraco; 5 fraco; 5,5 fraco; 6 fraco; 6,5 moderado; 7 médio; 7,5 bastante bom; 8 bom
Firmeza da folhagem	4 frágil; 4,5 frágil; 5 bastante frágil; 5,5 bastante frágil; 6 média; 6,5 média; 7 bastante firme; 7,5 bastante firme; 8 firme
Cor da pele	amarela vermelha amarela com olhos vermelhos castanha-avermelhada roxa
Cor da polpa	4 branca; 4,5 branca; 5 cremosa; 5,5 cremosa; 6 amarela clara; 6,5 amarela clara; 7 amarela; 7,5 amarela; 8 amarela escura; 8,5 laranja
Acabamento de pele	3 rugosa; 3,5 rugosa; 4 muito fraca; 4,5 fraca; 5 bastante fraca; 5,5 inferior á média; 6 média; 6,5 superior á média; 7 boa; 7,5 muito boa; 8 excelente
Forma dos tubérculos	**R** redonda **RO** redonda oval **OR** oval redonda **O** oval **OL** oval alongada **LO** longa oval **L** longa
Regularidade da forma	4 irregular; 4,5 irregular; 5 bastante irregular; 5,5 bastante irregular; 6 bastante irregular; 6,5 bastante irregular; 7 regular; 7,5 regular; 8 regular
Tuberização	4 baixa; 4,5 baixa; 5 baixa a média; 5,5 baixa a média; 6 média; 6,5 média; 7 média alta; 7,5 média alta; 8 alta; 8,5 alta; 9 alta
Regularidade do calibre	4 baixa; 4,5 baixa; 5 baixa a média; 5,5 baixa a média; 6 média; 6,5 média; 7 média alta; 7,5 média alta; 8 alta 8,5 alta; 9 alta
Calibre dos tubérculos	4 pequeno; 4,5 pequeno; 5 pequeno a médio; 5,5 pequeno a médio; 6 médio; 6,5 médio; 7 médio a grande; 7,5 médio a grande; 8 grande
Dormência	4 Curta; 4,5 Curta; 5 Média a curta; 5,5 Média a curta; 6 Média; 6,5 Média; 7 Média a longa; 7,5 Média a longa; 8 Longa

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos; Manchas negras; Rachamentos; Danos mecânicos	4 muito sensível; 4,5 muito sensível; 5 Sensível; 5,5 Sensível; 6 moderadamente sensível; 6,5 moderadamente sensível; 7 ligeiramente sensível; 7,5 ligeiramente sensível; 8 ligeiramente sensível a não sensível
Metribuzina (antes e depois emêrgencia)	3 & 3,5; muito sensível 4 muito sensível; 4,5 muito sensível; 5 Sensível; 5,5 Sensível; 6 moderadamente sensível; 6,5 moderadamente sensível; 7 ligeiramente sensível; 7,5 ligeiramente sensível; 8 ligeiramente sensível a não sensível

Disclaimer: *Na União Europeia, a aprovação da substância ativa metribuzina não foi renovada e os produtos fitofarmacêuticos que contêm metribuzina já não estão autorizados. Verifique sempre se os produtos fitofármacos e a sua utilização estão legalmente autorizados no país de cultivo.*

Etileno	**4 - 5%** menos tubérculos **4,5 - 5%** menos tubérculos **5 - 5% menos a 5%** mais tubérculos **5,5 - 5% menos a 5%** mais tubérculos **6 - 5% a 15%** mais tubérculos **6,5 - 5% a 15%** mais tubérculos **7 - 15% a 25%** mais tubérculos **7,5 - 15% a 25%** mais tubérculos **8 - 25%** mais tubérculos
Peso debaixo de água	300g menos, 500g mais
Teor de matéria seca	17% menos, 26,5% mais
Grupo culinário	**A** firme **AB** moderadamente firme **B** moderadamente farinhenta **BC** farinhenta **C** farinhenta **CD** farinhenta
Descoloração após cozedura	4 muito sensível; 4,5 muito sensível; 5 sensível; 5,5 sensível; 6 moderadamente sensível; 6,5 moderadamente sensível; 7 ligeiramente sensível; 7,5 ligeiramente sensível; 8 ligeiramente sensível a não sensível

descoloração em cru	4 muito sensível; 4,5 muito sensível; 5 sensível; 5,5 sensível; 6 moderadamente sensível; 6,5 moderadamente sensível; 7 ligeiramente sensível; 7,5 ligeiramente sensível; 8 ligeiramente sensível a não sensível
qualidade para fritura em palitos	4 inadequada; 4,5 inadequada; 5 inadequada; 5,5 inferior à média; 6 média; 6,5 superior à média; 7 boa; 7,5 muito boa; 8 excelente;
Distribuição da matéria seca	5 bastante baixa; 5,5 bastante baixa; 6 média; 6,5 média; 7 boa; 7,5 boa; 8 excelente; 8,5 excelente; 9 excelente; 9,5 excelente;
Qualidade para fritura em rodelas	4 inadequada; 4,5 inadequada; 5 inadequada; 5,5 inferior à média; 6 média; 6,5 superior à média; 7 boa; 7,5 muito boa; 8 excelente;
Nível TGA	Indica o nível de TGA (glicoalcalóides medidos em mg por 100g).

Sensibilidade e qualidade

Nemátodes do quisto da batateira; Nemátode dourado: Ro 1, 2, 3 e 4; Nemátode, Globodera pallida: Pa 2 e 3	Sensibilidad relativa (%) **9** < 1 **8** 1,1-3 **7** 3,1-5 **6** 5,1-10 **5** 10,1-15 **4** 15,1-25 **3** 25,1-50 **2** 50,1-100 **1** > 100
	1 suscetível; 2 suscetível; 3 suscetível; 4 suscetível; 5 moderadamente suscetível; 6 moderadamente suscetível; 7 resistente em campo; 8 resistente em campo; 9 resistente
Míldio da folha; Míldio do tubérculo; Sarna comum; Sarna pulverulenta; Fusarium; Antracnose; TRV; Vírus do enrolamento; Vírus Yn; Vírus - Yntn (tubérculo)	2 muito suscetível; 2,5 muito suscetível; 3 muito suscetível; 3,5 muito suscetível; 4 muito suscetível; 4,5 muito suscetível; 5 suscetível; 5,5 suscetível; 6 ligeiramente suscetível; 6,5 ligeiramente suscetível; 7 ligeiramente suscetível; 7,5 ligeiramente suscetível; 8 ligeiramente suscetível a não suscetível; 8,5 ligeiramente suscetível a não suscetível; 9 ligeiramente suscetível a não suscetível
Verruga negra F1, F6, F 18	1 muito suscetível; 2 muito suscetível; 3 muito suscetível; 4 muito suscetível; 5 bastante suscetível; 6 bastante suscetível; 7 moderadamente suscetível; 8 moderadamente suscetível; 9 ligeiramente suscetível; 10 resistente

Itens assinalados com asterisco (*) baseiam-se na nossa própria investigação e não foram ainda oficialmente publicados. ■

Notas.

English	Nederlands	Deutsch	Français	Español	Português
Baby potatoes	Krielaardappelen	Drillinge	Grenailles	Patatas baby	Babies
Black spot (internal bruising)	Stootblauw	Schwarzfleckigkeit	Noircissement de la chair	Antracnosis	Manchas negras
Breeder	Kweker	Züchter	Obtenteur	Obtentor	Obtentor
Common scab	Schurft	Schorf	Gale commune	Sarna común	Sarna comum
Convenience	Koelvers	Fertigprodukten	4ème gamme	Precocinadas	4ª Gama
Cooking type	Kooktype	Kochtyp	Type de cuisson	Tipo de cocción	Grupo culinário
Crisps	Chips	Chips	Chips	Patatas fritas de bolsa (chips)	Rodelas
Crisping quality	Geschikt voor chips	Geeignet für Chips	Utilisation possible en Chips	Calidad para chips	Qualidade para fritura em rodelas
Crossing	Kruising	Kreuzung	Croisement	Cruzamiento	Cruzamento
Discolouration after cooking	Grauwverkleuring (na koken)	Grauverfärbung (nach dem Kochen)	Noircissement après cuisson	Coloración gris (después de la cocción)	Descoloração após cozedura
Dormancy	Kiemrust	Keimruhe	Dormance	Dormancia	Dormência
Dry matter content	Drogestofgehalte	Trockensubstanzgehalt	Matière sèche	Contenido de materia seca	Teor de matéria seca
Dry matter distribution	Drogestofverdeling	Trockenmasseverteilung	Répartition de la matière sèche	Distribución de la materia seca	Distribuição da matéria seca
Flakes	Vlokken	Flocken	Flocon	Copos	Flocos
Flesh colour	Vleeskleur	Fleischfarbe	Couleur de la chair	Color de la carne	Cor da polpa
Flower colour	Bloemkleur	Blütenfarbe	Couleur de la fleur	Color de la flor	Cor da flor
Foliage - final development	Loof - ontwikkeling volledig	Laub - Entwicklung Ende	Feuillage - développement final	Follaje - desarrollo final	Folhagem - desenvolvimento final
Foliage - firmness	Loof - stevigheid plant	Laub - Festigkeit	Feuillage - tenue	Follaje - firmeza	Firmeza da folhagem
Foliage - initial development	Loof - ontwikkeling begin	Laub - Entwicklung Anfang	Feuillage - développement initial	Follaje - desarrollo inicial	Folhagem - desenvolvimento inicial
French fries	Frites	Pommes frites	Frites	Patatas fritas	Palitos
Fresh	Vers	Frisch	Frais	Frescas	Fresco
Fries quality	Geschikt voor friet	Geeignet für Pommes	Utilisation possible en Frites	Calidad para patatas fritas	Qualidade para fritura em palitos
Growth cracks	Groeischeuren	Wachstumsrisse	Crevasses	Grietas de crecimiento	Rachamentos
Harvest damage	Rooibeschadiging	Rodebeschädigung	Dégâts d'arrachage mécanique	Daños de recolección	Danos mecânicos
Late blight - foliage	Phytophthora - loof	Krautfäule	Mildiou du feuillage	Mildiu de la hoja	Míldio da folha
Late blight - tuber	Phytophthora - knol	Braunfäule	Mildiou du tubercule	Mildiu del tubérculo	Míldio do tubérculo
Light sprout colour	Kiemkleur	Lichtkeim	Couleur du germe	Color claro del brote	Brolho de cor clara
Maturity	Rijptijd	Reifezeit	Maturité	Madurez	Maturação
Organic	Biologisch	Biologisch	Biologique	Ecológico	Biológico
Potato cyst nematodes	Aardappelmoeheid	Kartoffelzystennematoden	Nématodes	Nematodos del quiste de la patata	Nemátodes do quisto da batateira
Powdery scab	Poederschurft	Pulverschorf	Gale poudreuse	Sarna pulverulenta	Sarna pulverulenta
Processing	Verwerking	Verarbeitung	Industrie	Transformación	Indústria
Raw discolouration	Rauwverkleuring	Rohverfärbung	Grisaillement	Coloración en crudo	Descoloração em cru
Regularity of tuber shape	Regelmaat knolvorm	Regelmäßigkeit der Knollenform	Régularité de la forme	Regularidad de la forma de los tubérculos	Regularidade da forma
Regularity of tuber size	Regelmaat sortering	Größenregelmäßigkeit	Homogénéité de la taille	Regularidad del tamaño	Regularidade do calibre
Retail	Retail	Einzelhandel	Retail	Venta al por menor	Retalho
Salads	Salade	Salatsorten	Vapeur	Ensaladas	Salada
Secondary growth	Doorwas	Durchwuchs	Repousse	Crecimiento secundario	Segundos crescimentos
Skin colour	Schilkleur	Schalenfarbe	Couleur de la peau	Color de la piel	Cor da pele
Skin finish	Schilhoedanigheid	Schalenqualität	Qualité de la peau	Finura de la piel	Acabamento de pele
Specials	Speciaal	Spezielle	Spécialité	Especiales	Especialidades
Spraing	Kringerigheid	Stippigkeit	Ferrure	Manchas y/o círculos necróticos	TRV
Starch	Zetmeel	Stärke	Fécule	Fécula	Fécula
Traditional	Traditioneel	Traditionell	Traditionelle (consommation)	Tradicional	Tradicional
Tuberisation	Knolzetting	Knollenbildung	Tubérisation	Tuberización	Tuberização
Tuber shape	Knolvorm	Knollenform	Forme du tubercule	Forma de los tubérculos	Forma dos tubérculos
Tuber size	Grofheid knollen	Knollengrösse	Grosseur des tubercules	Tamaño de los tubérculos	Calibre dos tubérculos
Underwater weight	Onderwatergewicht	Unterwassergewicht	Poids sous eau	Peso bajo agua	Peso debaixo de água
Wart disease	Wratziekte	Kartoffelkrebs	Gale verruqueuse	Sarna verrugosa	Verruga negra

Notas.

Same catalogue, different language?

This variety catalogue is available digitally in the following languages
English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | Português

agricopotatoes.pt/
catalogue/english

agricopotatoes.pt/
catalogue/german

agricopotatoes.pt/
catalogue/spanish

agricopotatoes.pt/
catalogue/french

agricopotatoes.pt/
catalogue/dutch

agricopotatoes.pt/
catalogue/portugese

Cultivation recommendations are available in many languages on our website or via our local partner in the relevant country.



ORD-2627680 | 2026-2027

Agrico
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
The Netherlands
T +31 (0)527 639911 / **E** info@agrico.nl
I agricopotatoes.pt