

Erika.

MARKTSEGMENT

R

Retail
Salade, Vers

Een vroeg, vastkokend tafel- en saladeras met een goede schurftresistentie.

- » Mooie presentatie
- » Hoog knolaantal
- » Goede Y-virusresistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Kruising: MARABEL x AR 88-0156
Zaailing: NO 98-0132
Kwekersrecht: 31-12-2040

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling volledig: matig / 6,5
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: lang ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 337
Drogestofgehalte: 18,6%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 2,6

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Kooktype: vastkokend / A
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/erika

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/50 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5

Phytophthora knol: zeer vatbaar / 4

Schurft: weinig vatbaar / 7

Poederschurft: vatbaar / 5,5

Fusarium: vatbaar / 5

Erwinia: weinig vatbaar / 7

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -