

Kuras.

MARKTSEGMENT

P

Verwerkende
industrie
Zetmeel

Een laat ras voor de zetmeelteelt met
resistentie tegen aardappelmoeheid
en een zeer goede zetmeelopbrengst.

- » Witte vleeskleur
- » Goede bewaarbaarheid
- » Goede resistentie tegen
virus en Phytophthora



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: G. Kuper
Kruising: PG 285 x AR 69-0491
Zaailing: KU 80-1271
Kwekersrecht: 31-12-2023

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 4
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: wit / 4,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: rond ovaal
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschadiging: gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht: 490
Drogestofgehalte: 25,9%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 33,8

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Kooktype: kruimig / C
Rauwverkleuring: - / -
Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4,5


www.agrico.nl/kuras

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: resistent* / 9*

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 5

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '*' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.