


كوندور

الإسم
KONDOR



وصف صنف رئيسي مبكر ذا قشرة حمراء وله مقاومة جيدة للحرارة وذو محصول وفير للغاية.

توصية زراعة



المسافة بين نبتة وأخرى
للبذات الصغيرة (وحدة القياس ملم)
٣٥٢٨: ٣٥٢٨ سم (٦.٥...٦ نبتة /هكتار)
للبذات متوسطة الحجم (وحدة القياس ملم)
٥٤٣٥: ٥٤٣٥ سم (٥...٥ نبتة /هكتار)

نيتروجين: ما ينصح به كقاعدة - ١٪.
فوسفات: ما ينصح به كقاعدة
بوتاسيوم: ما ينصح به كقاعدة + ١٪.

تحضير

الأعشاب الضارة
الاستخدام القياسي
لمبيد الأعشاب الضارة
ميتربيوزن (سيتكور) بعد
ظهوره وهذا يمكن أن
يؤثر بعض الشيء على
الأوراق ونادرًا ما يؤثر
على المحصول.

إنفسانس فيتوفثروا
من الضوري وضع
جدول رش وفائي
صارم ضد مرض اللقحة
المتأخرة.

الحصاد
نظرًا لحساسيتها للبقعة السوداء
وأضرار الحصاد يجب عليك الإنتظار
لمدة ثلاثة أسابيع للحصاد على
الأقل بعد القيام بمكافحة الآفات
والأمراض.

الخزن
درجة الحرارة المفضلة
هي ٥ مئوي. مناسب
للخزن الطويل المدى.

WWW.AGRICO.NL/FR

بذلت شركة أخريكو كل ما بوسعها لتقديم هذا الشرح . ورغم ذلك نود التنوية بأن هذه المعلومات قد تكون عرضة للتغيير وأن شركة أخريكو لا تتحمل
أية مسؤولية عن الأخطاء أو السهو. ولاتتحمل أخريكو أية مسؤولية عن أية أضرار ناتجة او متعلقة بهذه المعلومات المذكورة في هذا الشرح.

تابعونا على الفيسبوك <https://www.facebook.com/AgricoPotatoesAlgeria> 