

Fontane.

MARKTSEGMENT

P

**Verwerkende
industrie**
Vlokken, Chips,
Frites

Een middenlaar, hoogopbrengend
verwerkingsras voor de frites-
en droog industrie.

- » Grove knollen
- » Hoog onderwatergewicht
- » Geschikt voor diverse grondsoorten



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: AGRIA x AR 76-034-03
Zaailing: SW 87-1140
Kwekersrecht: 31-12-2028

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaar / 5,5
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 430
Drogestofgehalte: 23,2%
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
TGA-gehalte: 6,1

Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Kooktype: kruimig / BC
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/fontane

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 30%. Het is mogelijk om organische mest te gebruiken.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): matig vatbaar / 6

Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F18 (T1): - / -