


Esmee.

Srednje rana sorta lijepe crvene boje pokožice koja dobro podnosi visoke temperature, dobrog prinosa.

- ▶ Lijep izgled
- ▶ Krupni gomolji
- ▶ Otporan na više tipova virusa



TRŽIŠNA NAMJENA



Tradicionalna

Maloprodaja
Svježa

KARAKTERISTIKE

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: LAURA x RODEO
Sjeme: AR 01-0410

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 6,5
Boja klice: crveno ljubičasta
Boja cvijeta: svjetloljubičasta
Broj bobica: nema / 4
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7
Krajnji razvoj lisne mase: sasvim dobro / 7,5
Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7

Boja mesa: žuta / 7
Boja pokožice: crvena
Glatkoća pokožice: izvrstan / 8
Krupnoća gomolja: krupan / 8
Oblik gomolja: ovalno izduženi
Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6,5
Tuberizacija: prosječan / 6
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: prosječna / 6
Metribuzin: vrlo osjetljiv / 4
Bentazon: malo osjetljiv / 7

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5
Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6
Nagnječenje (unutarnje): malo do neosjetljiv / 8
Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6,5

Podvodna težina: 326
Postotak suhe tvari: 18%
Raspodjela suhe tvari: - / -
TGA razina: 8,2

Kulinarski tip: umjereno čvrst / AB
Oksidacija sirovog krumpira: umjereno osjetljiv / 6
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): osjetljiv / 5,5



KAKO UZGOJITI

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke + 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke.

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Postupanje sa sjemenom

Moguća je sadnja izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka (zagrijavanja). Uklanjanje klice može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Nemojte koristiti metribuzin (Sencor) nakon nicanja jer uzrokuje jaku reakciju na lišću i znatno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: - / -

Zlatna nematoda Ro 2/3: otpornost u polju* / 8*

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4,5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 7

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6,5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 7

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 7

Nagnječenje: osjetljiv / 5,5

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 7

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

* Rezultati označeni zvjezdicom (*) temelje se na našem vlastitom istraživanju i još nisu službeno objavljeni.