

Corazon.

MARKTSEGMENT



Traditioneel

Retail
Vers

Een midden vroeg consumptieras met een rode schilkleur en vroeg een goede opbrengst.

- » Goede schilkwiteit
- » Vrij vastkokend
- » Brede resistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: EVOLUTION x MANITOU
Zaailing: SW 07-1082
Kwekersrecht: 31-12-2048

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood
Bloemkleur: licht paars
Hoeveelheid bessen: geen / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: rood
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 321
Drogestofgehalte: 17,8%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 10

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: - / -
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/corazon

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Fusarium: vatbaar / 5,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): resistent* / 10*

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '*' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.