

# Milva.

MARKTSEGMENT



Een laat consumptieras met een uitstekende schurftresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- » Vrij vastkokend
- » Grove knollen
- » Hoge knolzetting



## KARAKTERISTIEKEN

### Algemene kenmerken

Kweker: Saatzucht Berding  
Kruising: NENA x DUNJA  
Zaailing: NKG 86-1158  
Kwekersrecht: 31-12-2028

### Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: laat / 5  
Kiemkleur: blauw paars  
Bloemkleur: wit  
Hoeveelheid bessen: geen / 4  
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7  
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7  
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: geel / 7  
Schilkleur: geel  
Schilhoedanigheid: goed / 7  
Knolgrootte: vrij grof / 7,5  
Knolvorm: ovaal  
Regelmaat knolvorm: vrij onregelmatig / 5  
Knolzetting: hoog / 8  
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

### Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6  
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8  
Bentazon: redelijk gevoelig / 6  
Ethyleen: - / -  
Talent: - / -

Doorwas: redelijk gevoelig / 6  
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6  
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7  
Rooibeschadiging: gevoelig / 5

Onderwatergewicht: 380  
Drogestofgehalte: 20,7%  
Drogestofverdeling: - / -  
TGA-gehalte: 2,4

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4  
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4  
Kooktype: vrij kruimig / B  
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5  
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


[www.agrico.nl/milva](http://www.agrico.nl/milva)

# OM TE GROEIEN

## Bemesting<sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies + 10%.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies.

<sup>1</sup> Level of fertilization is based on soil analysis

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

**Aardappelmoeheid Ro 1/4:** resistent / 9

**Aardappelmoeheid Ro 2/3:** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 2:** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 3:** - / -

**Phytophthora loof:** zeer vatbaar / 4,5

**Phytophthora knol:** weinig vatbaar / 6

**Schurft:** weinig vatbaar / 7

**Poederschurft:** weinig vatbaar / 6

**Fusarium:** vatbaar / 5

**Erwinia:** weinig tot niet vatbaar / 8

**Zwarte spikkel:** - / -

**Kringerigheid:** vatbaar / 5

**Virus - Bladrol:** weinig vatbaar / 7

**Virus - A:** weinig tot niet vatbaar / 8

**Virus - X:** weinig tot niet vatbaar / 9

**Virus - Yn:** weinig vatbaar / 6

**Virus - Yntn:** weinig vatbaar / 6

**Wratziekte F1 (D1):** - / -

**Wratziekte F6 (O1):** - / -

**Wratziekte F18 (T1):** - / -