

Next Generation

Fenna.

Een middenlaat consumptieras met Phytophthora resistentie in loof en knol en geschikt voor zowel gangbare als biologische teelt.

- » Goede schilhoedanigheid
- » Vrij vastkokend
- » Geschikt voor diverse bereidingen



MARKTSEGMENT



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
 Kruising: AR 03-3659 x ATHLETE
 Zaailing: AR 09-1825
 Kwekersrecht: 31-12-2051

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 6
 Kiemkleur: rood
 Bloemkleur: licht paars
 Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5

Schilkleur: geel

Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5

Knalgrootte: vrij grof / 7

Knolvorm: lang ovaal

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5

Knolzetting: vrij hoog / 7

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5

Metribuzin: weinig gevoelig / 7

Bentazon: - / -

Ethyleen: - / -

Talent: - / -

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Groeischoenen: weinig gevoelig / 7

Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6

Rooibeschaadiging: redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht: 393

Drogestofgehalte: 21,4%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4

Frietkwaliteit: niet geschikt / 5

Kooktype: vrij vastkokend / AB

Rauwverkleuring: weinig tot niet gevoelig / 8

Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/fenna

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (66.500 planten/ha)

35/55 mm: 27-28 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: vatbaar / 5

Fusarium: zeer vatbaar / 4,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): resistent* / 10*

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '*' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.