

Vogue.

MARKTSEGMENT



Een midden vroeg consumptieras met regelmatige, grove knollen.

- ▶ Vrij vastkokend
- ▶ Grove knollen
- ▶ Goede droogtetolerantie



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.

Kruising: MARABEL x AMOROSA

Zaailing: KO 03-2027

Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 6,5

Kiemkleur: groen rood

Bloemkleur: wit

Hoeveelheid bessen: geen / 4

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: geel / 7

Schilkleur: geel

Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6

Knolgrootte: grof / 8

Knolvorm: ovaal lang

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: gemiddeld / 6

Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5

Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8

Bentazon: weinig gevoelig / 7

Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8

Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 311

Drogestofgehalte: 17,3%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: 3,7

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4

Frietkwaliteit: niet geschikt / 5

Kooktype: vrij vastkokend / AB

Rauwverkleuring: - / -

Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7,5


www.agrico.nl/vogue

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn: vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -