

Rousseau.


MARKTSEGMENT

R

Retail
Salade

Een midden vroeg roodschillig salade ras met een prachtige vorm en een regelmatige sortering.

- » Hoge knolzetting
- » Goede schilhoedanigheid
- » Predikaat chair ferme



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: CECILE x ROSAGOLD
Zaailing: SW 08-0012
Kwekersrecht: 31-12-2049

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: paars
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: rood
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: lang ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: hoog / 8
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
Bentazon: - / -
Ethyleen: 5% minder knollen / 4
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: gevoelig / 5,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschatiging: weinig gevoelig / 7,5

Onderwatergewicht: 378
Drogestofgehalte: 20,6%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 5,9

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: gevoelig / 5
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/rousseau

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/40 mm: 20-22 cm (65.000 planten/ha)

40/50 mm: 22-26 cm (55.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -